

ed. Willd. 3. p. 1539. Jacq. austr. 1. p. 9. t. 9. Allion. pedem. n. 829. t. 52. f. 2. Pall. ind. taur. Habl. taur. p. 161.

Chondrilla faxatilis viscosa, caule cnimidophoro. Column. ecphr. p. 238. ic. p. 240.

Occurrit in Tauriae collibus ficcis lapidosis. Floret Julio, Augusto. ♂

Semina nigra: pappo longe stipitato. Calyx imbricatus. An ad Lactucam potius referenda?

### 1592. PRENANTHES hispida.

Pr. foliis inferioribus runcinato-pinnatifidis dentatis: lobo extimo triangulari, caulinis sinuatis basi cordatis amplexicaulis; paniculâ subcorymbosâ, caule pedunculisque hispidis.

Habitat in Iberiâ. D. Steuen.

Caulis simplex sesquipedalis fistulosus pilis patulis glanduliferis apicem versus confertioribus hispidus. Folia dissecta, ut in Pr. murali lobis angustioribus acutioribusque. Panicula terminalis subcorymbosa: ramis pedunculisque valde hispidis. Flores Pr. murali paullo majores: calyce calyculato octophyllo glabro, flosculis denis duodenisve luteis. Pappus stipitatus.

### 1593. PRENANTHES erysimifolia.

Pr. foliis lyrato-pinnatifidis dentatis lobo terminali hastato, floribus dichotomo-corymbosis. Linn. ed. Willd. 3. p. 1543.

Chondrilla orientalis maxima Cichorii sylvestris folio. Tournef. cor. p. 36.

Habitat in Iberiae subalpinis, ad fluvium Kfani.

Planta glaberrima. Folia radicalia et caulina inferiora dissecta petiolata: petiolo amplexicauli sagittato, superiora minuta lanceolato-sagittata remota, ut caulis maximâ ex parte nudus appareat. Flores facie Pr. muralis: calyce 5-phylo calyculo minimo, flosculis quinque luteis.