

\* \* *Foliis caulinis petiolatis non amplexicaulibus.* — Asiaticæ.

3. *P. BRUNONIANA* (Wall. ! cat. n. 3278. comp. 388), caule erecto apice paniculato, foliis caulinis petiolatis ovato-lanceolatis mucronato-dentatis basi subcordatis et angustè decurrentibus apice acuminatis, summis lanceolatis, capitulis cylindricis 3-4-floris. — in Emodo Kamaonensi Ind. or. Variat glabra, aut caule folisque secùs paginæ inf. nervum pilosiuscula. Petiolus angustè marginatus integer ant. dentatus et ideò folia infer. fortè sublyrata. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)
4. *P. QUINQUELOBA* (Wall. ! cat. comp. n. 371), caule erecto simplici apice paniculato, foliis longè petiolatis cordatis grossè et acutè dentatis subninquelobis, summis lineari-lanceolatis inciso-dentatis imò linearibus integerrimis, invol. 4-5-phyllis 4-5-floris. ? in Gossain-Than Nepaliæ legit cl. Wallich. Radix fasciculato-fibrosa. Herba glabra circ. bipedalis. Invol. squamæ acutæ. (v. s. comm. cum priore.)
5. *P. ALLIARIÆFOLIA*, caule simplici apice paniculato hinc indè petiolisque præsertim setiferis, foliis caulinis longè petiolatis cordatis acuminatis grossè dentatis, dentibus mucronatis, foliis paniculæ subsessilibus lineari-lanceolatis, capit. cylindraceis elongatis 3-floris. — In Indiæ orient. provinciis boreali-occident. legit cl. Royle. Capitula 8-9 lin. longa. Cor. purpureæ. Folia magnit. et formâ Alliariz. Setæ caulis et petiolorum subrispæ septulata. (v. s. comm. à cl. Royle.)
6. *P. RAPHANIFOLIA*, glabra, caule erecto ramoso paniculato, foliis caulinis sessilibus basi attenuatis pinnatifidis acuminatis, lobis acutis dentatis, dentibus mucronatis, capitulis cylindraceis 3-floris. — in Indiæ orient. provinciis occid. legit cl. Royle. Capit. 5-6 lin. longa. Cor. purpureæ. (v. s. comm. à cl. invent.)
7. *P. HISPIDULA*, caule apice ramoso, petiolis folisque sparse setoso-hispidulis, foliis caulinis aliis ovatis aliis trifidis, omnibus acuminatis dentatis, dentibus longè et callosè mucronatis, capitulis glabris cylindraceis 4-floris. — in Indiæ orient. prov. occid. legit cl. Royle. Fl. purpurei. Capitula 6-7 lin. longa. Pappus densius quàm priorum barbellatus. (v. s. comm. à cl. Royle.)
8. *P. ROSTRATA* (Blume ! bijdr. p. 836), caule simplici apice paniculato, foliis infer. pinnatisectis, segmentis 5-7 aristato-dentatis ovatis longè acuminatis, super. pinnatipartitis, lobis angustioribus elongatis, omnium terminali majore, invol. 3-4-floris. — in sylvis altioribus montium ins. Javæ. — Caulis teres glaber fistulosus. Ramuli et nervi fol. jun. puberulo-pulverulenti. Panicula longissima ovata. (v. s. comm. à cl. Blume.)

† *Species non satis notæ.*

9. *P. ? ERYSIMIFOLIA* (Willd. spec. 3. p. 1543), caule erecto, foliis lyrato-pinnatifidis dentatis, lobo terminali hastato, corymbo nudo divaricato dichotomo. — in Ponto. Chondrilla orientalis maxima Cichorii sylvestris folio. Tourn. Cor. 36. Ch. erysimifolia Poir. suppl. 2. p. 331. Cæt. ign.
10. *P. ? HISPIDA* (Pall. itin. 1. app. n. 126. et ed. gall. app. n. 394), caule erecto ramoso virgato setis sparsis hispidulo, foliis linearibus integerrimis basi setosis, capitulis paucis erectis 8-10-floris, invol. 8-phyllis, pappo sessili. — in imperio Rossico ad ripas flum. Rhymini (Oural) montosas infra Oropolim. Chondrilla hispida Poir. suppl. 2. p. 328. Flores pallidè flavi. Differt à Prenanthe fl. flavis in inv. 8-10. An Chondrillæ ex Cass., an potiùs Youngiæ sp.?
11. *P. ? JAVANICA* (Willd. sp. 3. p. 1534), caule erecto simplici, foliis caulinis cordato-amplexicaulibus oblongo-lanceolatis inæqualiter dentatis. . . — in Javâ detexit cl. Garcin. Hieracium Javanicum Burm. fl. ind. 174. t. 57. f. 1. Pren. Javanica Blume bijdr. 887? Sonchus Javanicus Spreng. syst. 3. p. 648. Corymbus 4-cephalus. Invol. glabra ecalyculata. Cor. purpureæ ex Burm. Panicula pyramidata ex Blume An duæ stirpes omninò eadem? An Mulgedii sp.?