

## XIX. SYNGENESIA. POLYGAMIA ÆQUALIS.

chondril- 8. PRENANTHES flosculis denis, calycibus octofidis, foliis lanceolatis : radicalibus indivisis subdentatis.

*Ard. Spec. 2. p. 36. t. 17.*

*Habitat in Europa australi. 2.*

*Caulis paniculatus. Folia caulinæ linearia, ad ramificationes tantum, minuta. Radicalia lanceolata, petiolata, nuda, minute dentata.*

japonica. 9. PRENANTHES flosculis subquindenis, foliis radi- calibus lyratis, caule subnudo.

*Habitat in Japonia. Kleynhoff.*

*Folia Radicalia lyrata (*Lapsana communis*), obtusiflora, vix denticulata, nuda. Caulis paniculatus, vix basi foliosus foliis lanceolatis. Flores numerosissimi, minimi, lutei pedunculis capillaribus. Calyces calyculati, Flosculi circiter 15. Pappus simplex, calyce longior.*

dentatum. 9. LEONTODON foliis ovatis: petiolis dentatis, scapo nudo unifloro.

*Hieracium foliis ovato-lanceolatis dentatis petiolatis: petiolis dentatis. Hall. emend. IV. n. 251.*

*Habitat in Helvetia. 2.*

*Folia omnia radicalia, ovata, fere lyrata, integriusculta, subincana. Petioli longitudine folii, dentati. Scapi simplices, uniflori, longitudine foliorum. Calyx erectus, cinerascens.*

neglecta. 15. CREPIS fol. amplexicaulibus runcinatis subpilosis, calycibus inermi-subspinosis, caule paniculato.

*Habitat in Italia. ○.*

*Caulis pedalis, ramosus, subpilosus, erectus. Folia Radicalia obovato-oblonga, dentata, subpilosa. Caulina amplexicaulia, runcinata, subpilosa dentibus elongatis etiam baseos. Summa subhastata. Rami floriferi elongati, nudi, laeves, apice biflori s. bifidi. Calyx exterior brevissimus, acutus; interior 8 s. 10 foliolis, in medio una alterave spina inermi notatis; Convenit cum C. pulchra magnitudine & parvis floribus; differt foliis, non integris subdenta-  
tis*