

Caulis bipedalis, erectus, ramosus, teres, lævis, superne fuscus.

Folia radicalia s. *inferiora* runcinata, dentata, tenuissime denticulata.

superiora sagittata, amplexicaulia, integerrima.

Flores e summitate caulis, pauciores pedunculati.

Pedunculi vix calyce longiores, squamati: squamis ovatis, arctis.

Calyces oblongi, Scorzonæræ, imbricati: squamis ovatis, obtusiusculis, convexis.

Corollæ pallide cæruleæ: limbo vix dupla calycis longitudine.

Semina obovata.

Pappus pilosus, stipitatus, brevissimus.

pinnata. **PRENANTHES** fruticosa, foliis cum impari pinnatis multiugis: foliolis linearibus integerrimis, panicula composita.

Habitat in rupibus Teneriffæ. *F. Masson.* †.

Frutex ramis teretiussculis, resinosis.

Folia approximata, petiolata, spithamæa, patienti-recurvata, pinnata: pinnis decem - ad duodecim-ugis, linearibus, tenuissimis, glaberrimis, integerrimis.

Panicula magna, composita.

Calyces glabri.

Flores parvi, lutei.

tomentosum. **LEONTODON** calyce oblongo, foliis lanceolatis indivisis subtus tomentosus, pappo stipitato.

Habitat in Iamaica.

Radix simplex.

Folia radicalia, lanceolata s. lanceolato - ovata, obsolete retrorsum ferrata, digitalia, supra arachnoidea, subtus albo - tomentosa.

Scapus foliis longior, superne magis tomentosus.

Calyx oblongus, imbricatus: squamis subpapposis, linearibus, acutis, margine submembranaceis.

Semina oblonga, striata.

Pappus pilosus, stipitatus, rufescens.

Receptaculum nudum.