

*P. (lanceolata)* flosculis duodenis, foliis radicalibus lanceolatis integerrimis. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 49. t. 66. f. 2.*

*P. (integra)* foliis oblongis integris glabris panicula coarctata. *Thunb. jap. 300. \**

Lanzettblättriger Hasenlattich. W.

*Habitat in Japonia.* ☉

\*8. **PRENANTHES debilis.**

*P.* foliis ovatis sessilibus integerrimis, caule subnudo erecto. W.

*P.* foliis ovatis integris, caule subnudo erecto. *Thunb. jap. 300.*

Schwacher Hasenlattich. W.

*Habitat in Japonia ad viarum margines.* ☉

*Tota planta tenera glabra. Radix annua fibrosa. Caules e radice plures debiles erectiusculi subnudi pauciflori spithamaci. Folia radicalia plurima petiolata ovata obtusa integerrima digitata, caulina pauca sessilia. Flores terminales solitarii gemini vel terni lutei. Thunb. l. c.*

\*9. **PRENANTHES dentata.**

*P.* calycibus duodecimfloris, foliis subrotundo - ovatis dentatis amplexicaulibus, caule paniculato. W.

*P. (dentata)* foliis oblongis dentatis glabris caule paniculato. *Thunb. jap. 301.*

*P. (denticulata)* flosculis duodenis, foliis caulinis ovatis inaequaliter denticulatis. *Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 50. t. 66. f. 4.*

Gezählter Hasenlattich. W.

*Habitat in Japonia.*

*Tota planta glabra. Caulis teres striatus, erectus paniculatus pedalis usque bipedalis. Folia radicalia petiolata oblonga obtusa cum acumine denticulata palmaria; caulina amplexicaulia basi et medio ciliatodentata acuta digitalia. Rami floriferi virgati erecti paniculati. Pedunculi capillares patentis subumbellati. Thunb. l. c.*

\*10. **PRENANTHES rhombifolia.**

*P.* calycibus quinquefloris, foliis rhombico - ovatis duplicato-dentatis petiolatis, paniculis filiformibus. W.



*Prenanthes rhombifolia.* Humboldt.

Rauthenblättriger Hasenlattich. W.

*Habitat ad Caracas.* (v. f.)

*Caulis tripedalis erectus ramosus. Folia opposita petiolata bipollicaria ovato-rhombea basi attenuata integerrima, obtusa duplicato-dentata acuminata, glabra. Petioli longitudine foliorum. Paniculae filiformes quadripollicares in apice caulis et ramorum. Bractea lineares angustissimae ad ramorum paniculae axillas. Flores ut in P. murali sed minores. Pappus sessilis.* W.

\* 11. **PRENANTHES hastata.**

*P. foliis hastatis amplexicaulibus dentatis, caule ramoso.* Thunb. jap. 501.

Spontonförmiger Hasenlattich. W.

*Habitat in Japonia.*

*Glabra tota. Caulis teres striatus flexuoso-erectus purpurascens ramosus bipedalis. Rami alterni patuli cauli similes. Folia caulina et ramea semiamplexicaulia hastata subspathulata acuta, acute dentata pollicaria, superioribus sensim minoribus. Flores in ultimis ramis et ramulis terminales paniculati lutei. Panicula subrotunda parum patens, pedunculis brevissimis.* Thunb. l. c.

12. **PRENANTHES alba.**

*P. calycibus multifloris, foliis angulato-hastatis dentatis, floribus nutantibus racemosis paniculatis.* W.

*P. flosculis plurimis, floribus nutantibus subumbellatis, foliis hastato-angulatis.* Hort. cliff. 383. Gron. virg. 113.

*P. nov. anglicanus chenopodii foliis, radice bulbosa, sanguineo caule, floribus racemosis candidissimis.*

*Pluk. amalth. 195.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 51.*

Weißer Hasenlattich. W.

*Habitat in Carolina, Virginia, Pennsylvania.* 24 (v. f.)

*Folia radicalia ovata hastata acute dentata, interdum subrotundo-ovata dentata, rarius triloba dentata. Folia caulina subrotundo-ovata dentata petiolata basi obtusa; summa lanceolata dentata. Panicula e racemis bi-vel trifidis composita.* W.