

\* 13. PRENANTHES *rubicunda*. W.

P. calycibus multifloris, foliis ciliatis, inferioribus obovatis basi attenuatis subangulatis, summis lanceolatis integerrimis, racemo simplici floribus nutantibus. W.

*Prenanthes alba* B. Sp. pl. 1122.

P. autumnalis, flore dilute purpureo deorsum nutante spicatim ad caulem disposito, foliis scabris incisis, caule singulari. Gron. virg. I. p. 89.

Röthlicher Hasenlattich. W.

*Habitat in Pensylvania, Virginia.* 4 (v. f.)

Folia radicalia hastato-angulata dentata vel triloba subintegerrima subciliata. Cauis simplex erectus. Folia caulina obovato-spathulata subsessilia basi valde attenuata angulo uno alterove instructa, non dentata sed ciliata; superiora sessilia lanceolata integerrima ciliata. Racemus simplex terminalis. Differt a P. alba: foliis caulinis ciliatis basi attenuatis subsessilibus integerrimis, caule simplici humiliori, racemo terminali simplici W.

14. PRENANTHES *repens*.

P. calycibus multifloris, foliis inferioribus trilobis integerrimis, floralibus lanceolatis dentatis, pedunculis bifloris. W.

P. foliis trilobis. Amoen. acad. 2. p. 560. t. 4. f. 23. \*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 52.

Kriechender Hasenlattich. W.

*Habitat in Sibiria orientali.* 4

Canis farmentosus humifusus; fructificans digitatis erectus. Folia in caule farmentoso triloba petiolata integerrima; in fructificante lanceolata pauca dentata sessilia. Pedunculi terminales biflori. W.

15. PRENANTHES *altissima*.

P. calycibus subquinquefloris, foliis trilobis petiolatis angulatis denticulatis margine scabris, racemis axillaribus, floribus nutantibus. W.

P. flosculis quinis, foliis trilobis, caule erecto. Sp. pl. 1121. Mill. dict. 8. n. 3.

P. canadensis altissima, foliis rariis, flore luteo. Vaill. act. 1721. p. 194.