

Lapsana communis var. *hirsuta*. *Schultes, Obs. bot., p. 170.*

Sonchus sylvaticus 1, 2 et 3. *Tabern., Kräuterb., p. 500 et 501 c. icone et descr. excl. vero descriptione Sonchi sylvatici 3, quæ cum Prenanthe purpurea convenit.*

Soncho affinis *Lapsana domestica* et *sylvatica* (excl. syn. Camer. ad Raphanum spectante). *C. B., Pin., p. 124.*

Inthybus s. *Endivia erecta lutea napifolia Lampsana dicta. Moris., Hist., 3, p. 54, sect. 7, tab. 1, fig. 9, c. copiâ rudi ic. Dodon.*

Obs. Synonymiam fusiùs tractavi quia nomine *Lampsanæ communis* et *sylvaticæ* cl. Wallr. (*Beitr. z. Botanik, 2, p. 125-158*) nuper duce *Tabern., C. Bauh. et Rurpio* formam *sylvaticam* à *domesticâ* in *rueratis* crescente (elongatam, glabrescentem, dentibus foliorum acutioribus, diagnosis *L. sylvaticæ*) specificè separat. Secundum observationes meas, annuentibus *J. Bauh., Hållero* omnibusque serè botanicis formæ memoratæ à loco natali oriuntur.

Species nostra nempe est polymorpha et variat pubescens-hirsuta, imo ramis pilis glanduliferis munitis (*Monachium, Bannatus, Palatinatus*) et foliis, more *Hieracii murorum* *Linn., brunneo-purpureo-maculatis* (*Palatin.*) et crispis.

HAB. In sylvâ *Castaneæ* supra villa *Orotava*, ex *Buch*, in *rueratis Teneriffæ* ad oppidum *Laguna* et alibi, et in insulâ *Palmâ*: *Webb!* verosimiliter introducta. Specimina *canariensia* — glabrescentia, vel pubescentia, imò *hirsuta*, ab *europæis* non differunt.

DISTRIB. GEOGR. Planta *europæa* polymorpha, cum hominibus non rarò migravit e. g. in *Maderam*, circa urbem *Funchal*: *Webb!* imò in *Americam borealem* sec. *Hook. fl. bor. amer., J, p. 296, et Torr. et Gr. fl. of North Americ., II, p. 466.*

PRENANTHES. LINN. ex parte. — C. H. Schultz Bip.

CAPITULA 5-flora. INVOLUCRUM cylindraceum, subimbricatum, squamis int. 5 linearibus, obtusis, externis totidem duplo-sextuplo brevioribus. FLORES styli ramis hirtis lineâ unâ superatis. ACHÆNIA cylindraceo-compressa, glabra, areolâ apicali magnâ, margine pappo coronata niveo, flexili, setis subæqualibus distanter et breve extrorso-antrorso-denticulatis.

Subgen. I. *Achænia glabra*, non sulcata. Pappus pluriserialis, achæni longitudine. Capitula nutantia. Flores purpurei. Herbæ perennes, foliis sessilibus cordatis. — *Euprenanthes*. C. H. Schultz Bip. MS. — Typus: *Prenanthes purpurea*. *Linn.*

Subgen. II. *Chrysoprenanthes*. C. H. Schultz Bip. *Achænia glabra*, 5-sulcata. Pappus achænio brevior. Capitula erecta; flores flavi. Suffrutex *canariensis* glaber, foliis longe petiolatis pinnatifidis, lobis integerrimis, triangularibus, acuminatis, corymbo myriocephalo. Typus: *Prenanthes pendula*. C. H. Schultz Bip.