

- Prenanthes Tatarinowii n. sp.<sup>1)</sup>.  
*Mulgedium tataricum* DC. (*Sonchus lactu-*  
*coides* B. 228).  
*Cichoriacea quaedam* (*Chorisma* sp.?).  
*Campanulaceae* 8. *Platycodon grandiflorus* ADC.  
 B. 233.  
*Glossocomia ussuriensis* Rupr. et Maxim.  
*Adenophora trachelioides* Maxim.  
 » *latifolia* Fisch.?  
 » *coronopifolia* Fisch.  
 » *species* 3.  
*Ericaceae* 2. *Rhododendron micranthum* Turcz.  
 126.  
 » *mucronatum* Turcz. 125.  
*Pyrolaceae*. *Pyrola rotundifolia* L. γ. *incarnata* DC.  
*Primulaceae* 7. *Primula* n. sp. aff. *P. nivalis*.  
*Androsace saxifragae* Bge. 297. T. 167.  
*Cortusa Matthioli* L.  
*Glaux maritima* L. B. 300. T. 168.  
*Lysimachia barystachys* Bge. 298. T. 165.  
 » *davurica* Led.  
*Apochoris pentapetala* Duby. B. 299. T. 166.  
*Ebenaceae* 2. *Diospyros Lotus* L. B. 236. T. 127.  
 » *Kaki* L. B. 237. (D. Schitse).  
*Oleaceae* 5. *Fraxinus Bungeana* DC. B. 343. T. 130.  
*Syringa villosa* Vahl.  
 » *pubescens* Turcz. XIII, 30.  
 » *amurensis* Rupr. var. *pekinen-*  
*sis* m. (an *Ligustrum lucidum*  
 T. 129?).  
*Linociera chinensis* Fisch. ined.  
*Jasmineae*. *Jasminum floridum* Bge. 239 (quasi  
 sponte).  
*Apocynaceae*. *Apocynum venetum* L. B. 243. T. 131.  
*Asclepiadaceae* 11. *Periploca sepium* Bge. 244. T.  
 132.
- Metaplexis Stauntoni* R. S. B. 247. T. 135.  
*Pycnostelma chinense* Bge. 245. T. 134.  
*Vincetoxicum atratum* Morr. Dne. B. 251.  
 T. 138.  
 » *versicolor* Dne. B. 250. T. 137.  
 » *sibiricum* Dne. B. 249. T. 139.  
*Genus novum* *Vincetoxicum affine*.  
*Cynanchum roseum* R. Br.  
 » *pubescens* Bge. 248. T. 136.  
*Symphyoglossum hastatum* Turcz. Bull.  
 Mosc. XXI p. 255. T. 133.  
 B. 246.  
*Novum genus ex Asclepiadeis veris.*  
*Gentianae* 9. *Gentiana barbata* Froel.  
 » *aquatica* Ledeb. T. 140.  
 » *squarrosa* Ledeb. B. 252.  
 » sp. aff. *G. decumbenti* et *G. fri-*  
*gidae*.  
 » *macrophylla* Pall.  
*Ophelia chinensis* Bge. T. 141.  
*Halenia sibirica* Borkh.  
*Limnanthemum nymphoides* Lk. B. 253.  
 T. 142.  
*Pterygocalyx volubilis* Maxim.  
*Gesneriaceae* 2. *Baea hygrometrica* R Br. B. 301.  
 T. 155.  
*Rehmannia glutinosa* Libosch. B. 280.  
*Polemoniaceae*. *Polemonium coeruleum* L.  
*Convolvulaceae* 10. *Pharbitis Nil Choisy?* B. 258.  
 (Ipom. hederacea T. 147).  
*Convolvulus Ammanni* Desr. B. 261.  
 » *arvensis* L. B. 260.  
 » *spinulosus* L. fil.? B. 262. (verosimil.  
 C. *tragacanthoides* Turcz.)  
*Calystegia dahurica* Choisy. α. *pellita*  
 Choisy. B. 259. T. 146.

1) *Prenanthes Tatarinowii* m. Caule erecto striato foliato foliisque subtus parcus petiolis densius setosis; foliis petiolatis superne parce pilosiusculis, inferioribus lyratis: lobo terminali maximo cordato segmentis lateralibus binis ovalioblongis acuminatis minutis, ceteris ad segmentum terminale reductis deltoideocordatis rhomboides, superioribus ovato-lanceolatis omnibus acuminatis praeter summa linearilanceolata integerrima inaequaliter mucronatodentatis hispidulisque; paniculae polycephalae ramis patentibus juventute cum capitulis nondum florentibus nutantibus demum erectis; capituli elongatocylindrici 5-flori squamis extimis minutissimis linearibus intimis 5 linearibus obtusiusculis; stylis longe exsertis ligulam apice attenuatam minute 5-dentatam oblongam superantibus; achaenio 5-gono striato apice truncato pappo rufescente breviore. — Flores coerulei. — Hab. in declivibus montium a Pekino septentrionem versus, prope templum Tschshan-chanj, floret Augusto (Dr. Tatarinow legit).

Videtur affinis *P. quinquelobae* Wall. et *P. alliariaefoliae* DC.