

Prenanthes Faberii Hemsl. (IFS I, 486).

W Omei 3200 m (FB).

Prenanthes Brunouiana Wall.

S Tchen fong chan (DELAVAL).

B. **Prenanthes Khasiana** Clarke.

S Tchen fong chan (DELAVAL).

Prenanthes melanantha Franch. JdB IX, 294.O Ch^ceng k^ou (FA).

Prenanthes (Nabalus) vitifolia Diels n. sp.; caule subflexuoso glabro; foliorum petiolo exalato longo superiorum basi vaginante lamina membranacea supra sparsissime paleacea subtus glaberrima late cordato-ovata repando-angulato-lobata apice acuminata margine obsolete crenata atque denticulis setaceis exsertis remotis ornata racemulis abbreviatis paniculam angustam spiciformem interruptam efformantibus; capitulis crasse brevissimeque pedicellatis vel subsessilibus erectis 5—7-floris, calyculi biseriali squamis brevibus late ovatis subtriangularibus, ciliatis, involucri squamis 5—6 linearibus obtusiusculis glabris; floribus ochroleucis; pappo corolla breviora quam achaenium brunneum cylindricum utrinque leviter contractum longiore.

Höhe 0,6—1 m. Untere Blätter: Stiel 6—7, Spreite 44—43 × 40—44 cm. Inflorescenz bis 45 × 4 cm. Die größeren Schuppen des Calyculus 2 × 4,7 mm. Schuppen der Hülle 8—40 × 4—4,2 mm. Ovarium 4 mm. Krone 8—9 × 4,5 mm. Pappus 6—7 mm. Achaenium 3—4 × 0,7 mm.

»nin wei chⁱ ts^{ao}« (BvR 470), »yang wei chⁱ« (BvR 969).S Nan ch^{uan}: Ya chih pa, Wald (BvR 470 — fl. Aug.), Lao ti tzu (BvR 969 — fr. Sept.).

Diese isolierte Art vereinigt die Eigentümlichkeiten so vieler *Prenanthes*, dass es schwer hält, ihre nächste Verwandtschaft ausfindig zu machen, doch scheinen ihr einige Species Nord-Amerikas näher zu stehen als die asiatischen. Bemerkenswert ist vor allem die Blattform und die kurzen dicken Köpfchen-Stiele.

Zu *Prenanthes* gehören auch folgende zwei Nummern, die wohl neue Arten sind, aber so unvollständig vorliegen, dass ihre Beschreibung unmöglich ist.

1. Sehr große, reichblütige Rispe, vom Habitus der *Lactuca sororia*. Obere Blätter sehr dünn, lang lineal, ganz oder 3-lappig entfernt-denticulat.

»chien tao ts^{ai}«.S Nan ch^{uan}: Hou ts^{ao} kou, Lichtungen (BvR 488 — defl. Jul.).

2. Voriger ähnlich, aber Blüten größer und kräftiger. Untere Blätter (ob dazu gehörig?) fiederschnittig mit unregelmäßig geformten Segmenten.

»ma ch^{ih} han ts^{ao}«.S Nan ch^{uan}: Lung mo ai, Wiesen (BvR 874 — fl. Sept.), Talu ch^{ih} (BvR 987 — st.; fol. basil. Sept.).