

PSAMMOSERIS Boiss. et Reut.

Capitulum multiflorum. Involucrum uniseriale basi squamis paucis calyculatum phyllis immutatis. Receptaculum nudum foveolatum. Achenia exalata subcompressa sub 10 striata rostro setaceo albo eis quadruplò longiori terminata. Pappus multiserialis pilosus albus apici subin-
crassato rostri insertus deciduus. — Herbæ annuæ Ægyptiacæ et Ara-
bicæ arenicolæ.

Genus a *Barckausiâ* cui affine distinctum acheniis brevibus subcom-
pressis nec tereti-cylindricis, abruptè in rostrum longissimum album
nec ex achenii substantiâ ortum attenuatis.

PSAMMOSERIS SENECIOIDES Boiss. et Reut.

Ps. annua sub lente parcè et brevissimè hirtula, foliis rosulatis lan-
ceolato-linearibus acutis pinnatilobatis dentatisve lobis triangularibus
argutis margine parcè ciliatis, caulis multis ascendentibus scapifor-
mibus foliis vix longioribus simplicibus vel a medio ramosis 2-3 ce-
phalis foliis 1-2 linearibus vel lineari-setaceis obsitis, capitulis minimis
subcylindricis pedunculis setis brevibus paucis obsitis vel glabris, caly-
culo involucro quadruplò breviori, involuci livescentis phyllis conni-
ventibus angustè nigrescenti-marginatis lineari-lanceolatis obtusius-
culis dorso serie simplici aculeolato-setulosis, ligulis extùs rubellis in-
volucro paulò longioribus.

Barckhausia senecioides Spr. — *Crepis senecioides* Delile Æg.
tab. 42, fig. 2.

Hab. in arenosis Ægypti circâ Kahiram (Del.) in palmetis ad Sackara.
(Boiss.)

PSAMMOSERIS ARABICA Boiss. et Reut.

Ps. annua sub lente brevissimè setuloso-hirta, foliis rosulatis oblon-
gis argutè dentatis pinnatilobatis partitisve segmentis parvis ovatis
sæpè parcè denticulatis, caulis pluribus ascendentibus a medio sub-
dichotomè et breviter ramosis 3-7 cephalis foliis 2-4 plò longioribus,
folio caulino inferiori sæpè pinnatisecto reliquis minimis setaceis, pe-
dunculis glanduloso-hirtis, capitulis mediocribus, calyculo involucro