

PSAMMOSERIS Boiss. et Reut.

Capitulum multiflorum. Involucrum uniseriale basi squamis paucis calyculatum phyllis immutatis. Receptaculum nudum foveolatum. Achenia exalata subcompressa sub 10 striata rostro setaceo albo eis quadruplò longiori terminata. Pappus multiserialis pilosus albus apici subin-
crassato rostri insertus deciduus. — Herbæ annuæ Ægyptiacæ et Ara-
bicæ arenicolæ.

Genus a *Barckausia* cui affine distinctum acheniis brevibus subcom-
pressis nec tereti-cylindricis, abruptè in rostrum longissimum album
nec ex achenii substantiâ ortum attenuatis.

PSAMMOSERIS SENECIOIDES Bois. et Reut.

Ps. annua sub lente parcè et brevissimè hirtula, foliis rosulatis lan-
ceolato-linearibus acutis pinnatilobatis dentatisve lobis triangularibus
argutis margine parcè ciliatis, caulis multis ascendentibus scapifor-
mibus foliis vix longioribus simplicibus vel a medio ramosis 2-3 ce-
phalis foliis 1-2 linearibus vel lineari-setaceis obsitis, capitulis minimis
subcylindricis pedunculis setis brevibus paucis obsitis vel glabris, caly-
culo involucro quadruplò breviori, involuci livescentis phyllis conni-
ventibus angustè nigrescenti-marginatis linearis-lanceolatis obtusius-
culis dorso serie simplici aculeolato-setulosis, ligulis extùs rubellis in-
volucro paulò longioribus.

Barckhausia senecioides Spr. — *Crepis senecioides* Delile Æg.
tab. 42, fig. 2.

Hab. in arenosis Ægypti circà Kahiram (Del.) in palmetis ad Sackara.
(Boiss.)

PSAMMOSERIS ARABICA Boiss. et Reut.

Ps. annua sub lente brevissimè setuloso-hirta, foliis rosulatis oblongis argutè dentatis pinnatilobatis partitisve segmentis parvis ovatis sàpè parcè denticulatis, caulis pluribus ascendentibus a medio subdichotomè et breviter ramosis 3-7 cephalis foliis 2-4 plò longioribus,
folio caulino inferiori sàpè pinnatisecto reliquis minimis setaceis, pe-
dunculis glanduloso-hirtis, capitulis mediocribus, calyculo involucro

triplo breviori, involuci phyllis conniventibus linear-lanceolatis obtusiusculis brevissimè setulis albis nigrisque hirtellis, ligulis luteis concoloribus involucra paulo superantibus.

Hab. in arenosis *Arabiæ petreæ* Palæstinam versus. Legi Apr. 1846.

Folia 1-1 1/2 poll. longa, caules 3-4 pollicares, capitula illis Sp. præcedentis majora, involuci phylla 5 lin. circ. longa. A præcedenti distincta foliis abbreviatis, caulis ramosioribus apice glandulosis, involucro densiusculè hirto. Habitus *Lagoseridis Nemausensis*.

CREPIS CRETICA Boiss. (Sect. *Barckhausia*.)

Cr. annua breviter hirtula, foliis omnibus radicalibus obovatis obsoletè denticulatis vel pinnatifidis, caulis numerosis setaceo-filiformibus ascendentibus simplicibus vel parcè ramosis glabris, capitulis minimis longiusculè pedunculatis, involuci squamis accessoriis 3-4 brevissimis setaceis, phyllis glabris vel dorso setulosis fructiferis patulis subinduratis canaliculatis dorso obtuse carinatis, acheniis oblongo-lanceolatis striatis apice in rostrum eis duplo brevius attenuatis, pappo valde deciduo achenio breviori.

Hab. in *Cretâ* undè retulit cl. Prof. Raulin.

Barckausia Cretica Boiss. in Raulin pl. Cret. exs.

Plantula 2-3 pollicaris, capitula eis *B. cernuæ* ferè minora, involuci phylla vix ultrà 2 lin, longa. A *B. cernuæ* acheniis rostratis, a *B. leotodontoides* Rchb, foliis non elongatis, caulis brevissimis acheniis dimidiò brevioribus distincta. *B. Suffreniana* rostro achenium æquanti, *B. bellidifolia* caulis crassioribus capitulis plus duplo majoribus differunt. Species ex duobus speciminibus tantum nota ulterius investiganda.

CREPIS SIEBERI Boiss. (Sect. *Eucrepis* DC.)

Cr. perennis, radicis præmorsæ fibris cylindricis tenuibus elongatis, collo lanâ rufescenti vestito, caule parcè pilosulo glabrovo supernè laxè corymboso-paniculato, foliis teneris lætè virentibus sub lente secùs costam densius in utrâque paginâ parcè setulosis radicalibus inferioribusque petiolatis interruptè lyrato-pinnatipartitis lobis lateribus numerosis a superioribus ovatis angulatis subretrorsis ad infimos triangulares sensim diminutis terminali majori basi truncato vel subcordato-ovato acutiusculo obsoletè dentato, folio caulino ad ramum in-