

*Achaenia rufa*, murielata; *Pappus albus*, tenax \*). In Georgia et Armenia.

733. *Barkhausia foetida* DC. In Radscha et Ossia.

734. *Barkhausia rhocadifolia* M. B. In Colchide.

735. *Crepis hieracioides* Willd. *γ. succisifolia* Froel. misc.  
In Mingrelia.

736. *Crepis youngiformis* C. Koch (Eucrepis DC.); Stricta, ex apice paniculato-corymbosa, crispulis pilis obsita; Folia obovato-lanceolata, sagittato-amplexicaulia; Calathidia (matura) cylindrica; Anthodium glaberrimum: exterius calyculatum, parvum, phyllis subquinque ovato-acuminatis; Corollae tubus pilosus. Species ad Youngiam ob achaeniorum formam et tubi corollini pilositate, nec non totius plantae statura maxime accedit. In itinerario meo caucasico T. II. sub nomine *C. parviflora* citavi, abs qua tamen flores majores et phylla exteriora ovato-acuminata, interiora contra glaberrima distinguunt. In Armenia occidentali.

737. *Crepis ciliata* C. Koch (Eucrepis DC.); Stricta; Caulis sulcatus, simplex, hispidus; Folia inferiora squamiformia, minima; reliqua lanceolata, oblongave, ex basi cordata, amplexicaulia, runcinata, ex margine et carina media pilis hispidis obtecta; Anthodium hispidum, ovatum, subimbricatum; Tubus corollinus pilosus. In Armenia boreali.

738. *Pterotheca nemensis* Cass.

α. *glaucescens*; Glabra; Folia dentata aut dentato-runcinata. In Armenia ubique.

β. *hirta*; Folia obscure viridia, lyrato-pinnatifida. In Georgia et Colchide.

\*) Cl. *DeCandolle* subtribus VII et VIII. (Lactuceas et Hieracieas)  
non optime pappo tenaci et fragili distinguit, quod in genere  
*Taraxaco* pappus uterque. Forma achaeniorum, ut jam cl. G. D.  
*J. Koch* monuit, meliorem notam characteristicam praebet.