

- C. RHOMBIFOLIA Willd. = *Youngia rhombifolia*.
 C. RUDERALIS Gærtn. = *Lactuca muralis*.
 C. RUNCINATA Wall. = *Youngia runcinata*.
 C. SESSÆANA Don. = *Pyrrophappus Sessæanus*.
 C. SESSILIFLORA Lam. = *Phænopus vimineus*.
 C. TENUIS Wall. = *Ixeris polycephala*.
 C. VIMINEA Lam. = *Phænopus vimineus*.

DCCCXX. PYRRHOPAPPUS. — *Chondrillæ* sect. *Crinissa* Don. — *Barkhausia* Nutt. *Ell. non alior.*

Capitulum multiflorum. Invol. duplex utrumque polyphyllum, squamis linearibus acuminatis, inter. 1-seriale erectum, exter. brevis laxum seu subpatulum. Recept. epaleaceum. Achænia oblonga submuricata apice attenuata in rostrum gracile elongatum. Pappus pilosus pluriserialis mollis rufescens. — Herbæ perennes Boreali-Americanæ rariùs Capenses. Folia lineari-lanceolata integra aut pinnatifida. Rami apice nudi 1-cephali. Flores intensè lutei. — Nomen ex *πυρρος* rufus, et *παππος* pappus. — Genus ferè medium inter *Chondrillam* et *Tragopogonem*, sed pappo rufescente fortè ad *Hieracias* potiùs referendum.

Sect. I. CRINISSA Don l. c.

Invol. squamæ exteriores lineari-setacæ subpatulæ. — Species Americana.

1. P. CAROLINIANUS (Nutt. gen. am. 2. p. 126 sub *Barkhausiâ*), glaber, caule erecto ramoso 2-3-cephalo, foliis lanceolatis acutis laciniatis subpinnatifidis aut subintegris, pedicellis longissimis, invol. squamis exter. lineari-subulatis. \mathcal{L} in Amer. bor. frequens à Virginiâ ad Floridam (Nutt.), in Louisianâ (Teintur.!), in Carolinâ ruderatis (Bosc! Michx.). *Ell. sketch* 2. p. 251. *Leontodon Carolinianum* Walt. fl. car. 192. *Scorzonera pinnatifida* Michx. fl. bor. am. 2. p. 89 non Lour. *Chondrilla lævigata* Pursh fl. 2. p. 497. Flores splendide citrei. Achæniûm rostro brevi. (v. s.)
2. P. MULTICAULIS, glaber, caulibus è collo plurimis adscendentibus erective ramosis, foliis lanceolatis variè pinnatilobatis, lobulis acutis, pedunculis nudis apice involuacroque brevissimè pubescente-furfuraceo, invol. squamis ext. lineari-subulatis brevibus, inter. pappum æquantibus linearibus margine subscariosis. — in Mexico ad Tamaulipas et S. Fernando de Bezar legit cl. Berlandier. Achænia muricata rostri longitudini æqualia; rostri apex sub pappo annulo villosus instructus. (v. s.)
3. P. SCAPOSUS, subpuberulus, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis subdentatis, scapo foliis duplò longiore nudo 1-cephalo, invol. squamis exter. lineari-subulatis brevibus. (2) in Mexico propè Bejar aprili florentem legit cl. Berlandier. Radix fusiformis subtuberosa. Achænia in meo specim. desiderantur. Pappus rufus et habitus omninò generis. (v. s.)
4. P. PAUCIFLORUS, glaber, caule erecto 1-2-cephalo nudiusculo, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis, summis in squamas pinnatifidas abeuntibus, invol. squamis exter. lineari-setaceis patulis. \mathcal{L} in Mexico. *Chondrilla pauciflora* Sessè et Moçin. ex Don trans. linn. soc. 16. p. 180 non Ledeb.
5. P. SESSÆANUS, glaber, caulibus plurimis 1-cephalis apice squamellosis, foliis radicalibus linearibus acuminatis subintegerrimis, caulino unico lanceolato, invol. squamis exter. lineari-setaceis patulis. \mathcal{L} in Mexico. *Chondrilla Sessæana* Don trans. linn. soc. 16. p. 180. Invol. squamæ sub apice tuberculo auctæ.

Sect. II. PIESIS.

Invol. squamæ exter. ovato-lanceolate adpressæ. — Species Capensis.