

Choa. L'autre, des environs de *Tchélatchékané*, a ses feuilles très-allongées, très-aiguës, ses segments lancéolés, très-aigus, et à dents très-étroites et très-aiguës.

Il ne me paraît pas possible, à moins que chaque espèce devienne un genre, de placer cette plante dans un autre genre que le genre *Lactuca*. C'est absolument la *Lactuca saligna*; seulement ses akènes sont terminés par un bec ou col plus court.

PYRHOPAPPUS. DC., *Prodr.*, VII, 144.

PYRHOPAPPUS HOCHSTETTERI. Nob.

LACTUCA HOCHSTETTERI. C. H. Schultz, in *pl. Schimp. Abyss.*, sect. I, 428.

P. perennis: caule erecto, spithameo aut bipedali et ultra ramossissimo; ramis teretibus, lævibus glabris; foliis caulinis distantibus, pinnatifartitis, segmentis lanceolato-linearibus acutis, distantibus, glaucis glabris, margine ciliato-dentatis: capitulis teretibus paucifloris subpaniculatis; involucri squamis externis parvulis subimbricatis inæqualibus, internis erectis, sæpius 5, lanceolatis, glaucis, glabrisque; akeniis maturis nigrescentibus, compressis elliptico-oblongis, vix punctato-tuberculatis; pappi setis pluriserialibus rufis, margine subscabris.

Crescit ad ripas stagnorum, in provincia *Tchéleukote*, mense Junio florens (Ant. Petit), et in cacumine montis *Koubi*, altitudine circiter 8000 pedum, in provincia *Semiène*, mense Junio (Schimper).

Observation. — Je rapporte au genre *Pyrhopappus* de De Candolle cette plante nommée *Lactuca Hochstetteri* par M. C.-H. Schultz. Ses akènes sont légèrement tuberculeux, les poils de son aigrette sont d'une teinte fauve jaunâtre, et ils m'ont paru offrir de petites dentelures très-écartées.

PYRHOPAPPUS HUMILIS. Nob.

LACTUCA HUMILIS. C. H. Schultz, in *pl. Schimp. Abyss.*, sect. II, 4472.

P. perennis: caudice crasso, perpendiculari; foliis rosellatis numerosissimis, lanceolatis acutis inæqualiter dentato-runcinatis utrinque glabris, glaucisque: scapo radicali aphylo, 1-2 uncias longo, 1-3-floro; capitulis teretibus, paucifloris; involucri foliolis inæqualibus lanceolatis subobtusis glabris, apice purpurascensibus;

akeniis compressis, subtuberculatis, apice breviter rostratis; pappi setis rufis barbellatis.

Crescit in locis siccis et petrosis prope *Entchetkab*, mense Junio florens (Schimper), et in montosis provinciæ *Choa* et in monte *Aladjé* (Ant. Petit).

Observation. — Nous rapportons encore cette espèce au genre *Pyrhopappus* pour les raisons exposées à l'espèce précédente. Celle-ci est fort distincte par son port, sa petite taille, ses feuilles lancéolées et ses tiges très-courtes portant d'un à trois capitules.

BARKHAUSIA. Mœnch, *Meth.*, 537; DC., *Prodr.*, VII, 152.

BARKHAUSIA SCHULTZII. Hochst., in *pl. Schimp. Abyss.*, sect. II, 861.

B. caule erecto tripedali, basi subsimplici parte superiore parce ramoso, subangulato hispido; foliis oblongis obtusis mucronulatis, margine subuncinato-dentatis, ciliatis, subtus pilis rigidis conspersis, inferioribus basi sensim in petiolum attenuatis, caulinis sessilibus, cordato-sagittatis semiamplexicaulibus; capitulis parce numerosis subcymosis; involucri foliolis exterioribus linearibus brevibus, laxis, interioribus lanceolatis apice acuminatis subobtusis, dorso nigrescente crinito-lanatis; akeniis (junioribus) apice vix attenuatis glabris, pappo subsessili.

Crescit in latere sylvatico montis *Taber*, prope *Adessella*, in provincia *Semiène*, mense Januario florens (Schimper).

Observation. — C'est une grande espèce qui, comme la *B. carbonaria*, a les écailles de son involucre couvertes dans toute leur partie moyenne de longs poils laineux et noirâtres, mais qui s'en distingue de suite par sa taille quatre ou cinq fois plus grande, par ses feuilles qui garnissent également la tige, etc.

BARKHAUSIA TENERRIMA. C. H. Schultz, in *pl. Schimp. Abyss.*, sect. II, n° 677.

B. caule erecto, parce ramoso, pedali, gracili glabro; foliis inferioribus oblongo-subobtusis tenui-membranaceis, dentatis, aut runcinato-dentatis, parte inferiori in petiolum longum attenuatis; capitulis solitariis, caulis ramificationes terminantibus; involucri foliolis externis linearibus laxis, pilis quibusdam nigrescentibus conspersis, internis lanceolatis acutis, lanuginosis et pilis nigrescen-