

2 Capitulos subsesseis, dispostos em espiga, com frequencia simples; folhas estreitas ou com segmentos estreitos, sublineares, as superiores inteiras e as inferiores pennatifendidas ou pennatipartidas, de ordinario umas e outras não espinhosas, ás vezes com as nervuras inferiormente pelludo-espinhosas; corollas amarellas. Planta de 6-16 dm., com o caule esbranquiçado, de ordinario simples, ás vezes ramoso. ♂. *Jun.-Out. Logares estereis, muros, campos cultivados, mattos, caminhos: Beira litt., Estrem., Alemt. litt.*

Capitulos pedunculados, reunidos em cachos paniculados; folhas largas ou com segmentos largos . . . . . **L. saligna**, L. 3

3 Achenios obovado-oblongos, pouco attenuados na base, largamente marginados, negro-purpureos, obsoletamente celheados no cimo; involucro majusculo (por fim, cerca de 15 mm. de comprimento); corollas amarellas, ás vezes violaceas inferiormente; panicula muito ampla, oblonga; folhas glaucescentes, com frequencia maculadas de violaceo, pelludo-espinhosas na margem e nas nervuras, as inferiores roncadas ou sinuado-dentadas. Planta de 6-20 dm., muito robusta, com o caule esbranquiçado ou violaceo. ♂. *Jul.-Set. Campos cultivados, arrelvados, sebes: de Trás-os-Montes ao Alemf. . . . . Alface brava maior. L. virosa, L.*

Achenios oblongos, bastante attenuados na base, estreitamente marginados, papilloso-pelludos perto do cimo; involucro mediocre (por fim não ou pouco excedendo 10 mm.); corollas amarello-pallidas. Plantas menos robustas . . . . . 4

Panicula subpyramidal, com folhas bracteiformes pequenas, ovado-amplexicaules; folhas rigidas, com a margem voltada para o caule, geralmente pelludo-aculeadas na nervura dorsal, roncadas ou pennatifendidas com os segmentos dentado-espinhosos. Planta de 6-12 dm., com o caule esbranquiçado, aculeado na base, ramoso superiormente. ♂. *Jun.-Set. Campos cultivados, mattos, sebes, incultos: quasi todo o paiz.*

. . . . . *Alface brava menor. L. Scariola*, L.  
Folhas indivisas, largamente lanceoladas, alongadas, denticulado-espinhosas. *Margens do Tejo, Malpicá. . . . . β. augustana* (All.).

4 Panicula subcorymbiforme, com folhas bracteiformes majusculas, suborbicular-amplexicaules; folhas molles, com a face voltada para o caule, verdes ou violaceas, glabras ou pouco pelludas na nervura média, as inferiores obovadas ou oblongas, inteiras ou denticuladas ou roncadas. Planta de 5-10 dm., com o caule ás vezes arroxado. ☉. *Jun.-Set. Cult., poucas vezes subspont. prox. das culturas. (De origem incerta, e para alguns forma cultural da anterior). . . . . Alface. L. sativa, L.*

Folhas oblongas, estreitas na base, subplanas e subinteiras, erectas. . . . . *A. orelha de mula, A. romana. α. longifolia*, Roz.

Folhas sinuado-crenadas ou dentadas, ondulado-crespas.

. . . . . *A. crespa. β. crispa*, L.

Folhas basilares subarredondadas, bolhosas, antes da anthese concavas e approximadas. . . . . *A. repolhuda. γ. capitata*, Roz.

785. **Reichardia**, Roth. — Capitulos multifloros, com involucro gomiloso de bracteas pluriseriadas, imbricadas, escarioso-marginadas; receptaculo plano ou concavo, nu; achenios prismaticos, contrahidos nas extremidades, pelo menos os externos com 4-5 costas bastante salientes e transversalmente crenado-verrugosas (os internos ás vezes mais delgados, cylindraceo-aclavados, lisos), com papilho sessil de pellos molles, brancos, adherentes na base e cahindo juntos. Hervas glabras, caulescentes, com as folhas caulinares amplexicaules e os pedunculos mais ou menos intumescidos no cimo, providos de bracteas escamiformes; capitulos solitarios, terminaes.

- Plantas longamente nuas no cimo; bracteas do involuero com a margem branco-escariosa, plana, as externas cordiforme-ovadas, mucronuladas; capitulos majusculos ou mediocres. . . . . 2
- 1 { Planta folhosa quasi até ao cimo, robusta, de 1,5-5 dm., erecta ou ascendente, vivaz; bracteas do involuero com a margem ferruginoso-escariosa crenulado-plicada muito larga, as externas cordiforme-orbiculares e recurvado-mucronadas; capitulos grandes; corollas amarello-doiradas, vermelhas inferiormente; folhas glaucas, oblongas ou oblongo-lanceoladas, pennatifendidas ou sinuadas, espinuloso-denticuladas; pedunculos muito intumescidos no cimo (*var. lusitanica*, [Rouy]).  $\alpha$ . Abril-Jun. Areias e rochedos do littoral: do Minho ao Alg. (*frequente*). . . . . **R. gaditana** (Wk.).
- Corollas amarellas superiormente e livido-esverdeadas inferiormente; bracteas do involuero com a margem escariosa estreita, as externas encostadas; folhas oblongas ou oblongo-lanceoladas, pennatipartidas ou pennatifendidas ou sinuadas, com os segmentos inteiros ou denticulados. Planta vivaz, de 1-4,5 dm., erecta ou ascendente.  $\alpha$ . Fev.-Set.. Campos cultivados, terrenos arenosos ou pedregosos: Estrem (*frequente*). . . . . **R. picroides** (L.), Roth.
- 2 { Planta lenhosa na base, com as folhas alongadas, glaucescentes, as caulinares pouco numerosas; capitulos um pouco maiores. *Rochedos maritimos: arred. de Lisboa* . . . . .  $\beta$ . *maritima* (Bss.)
- Corollas amarellas dos 2 lados ou avermelhadas inferiormente; bracteas do involuero com a margem escariosa larga, as externas pouco encostadas; folhas obovado-oblongas ou oblongo-lanceoladas, indivisas ou sinuado-lobadas, espinuloso-denticuladas. Planta annual, de 2-7 dm., erecta.  $\odot$ . Fev.-Jun. Campos cultivados e incultos, vinhas, searas, charnecas, caminhos: Beira litt., Estrem., Alemt. e Alg. (*frequente*). . . . . **R. intermedia** (Schultz-Bip.).

786. **Crepis**, L. — Capitulos com involuero cylindrico ou cylindrico-campulado de bracteas imbricadas, as externas ás vezes caliculiformes; receptaculo plano ou convexo, verrugoso ou alveolado, glabro ou viloso; achenios angulosos, costados, papilloso-asperos ou lisos, rostrados ou attenuados no cimo e com papillo de pellos brancos macios. Hervas, de ordinario polymorphas, com os capitulos dispostos em cymeiras mais ou menos corymbiformes, poucas vezes solitarios; corollas amarellas ou avermelhadas.

- 1 { Achenios rostrados, papilloso-asperos; receptaculo viloso; capitulos corymbosos. (*Barkhausia*, Mnch.).. . . . 2
- { Achenios não rostrados. . . . . 4
- 2 { Involuero com as bracteas quasi do mesmo tamanho, as externas ovadas e as internas lanceolado-lineares, tenuemente tomentoso, glanduloso; folhas inferiores attenuadas em peciolo, sinuado-dentadas ou roncínadas, as caulinares subsagittadas, estreitas, sinuadas ou dentadas. Planta ascendente, ramosa desde a base, pelludo-glandulosa, sobretudo no cimo.  $\odot$ . Jun.-Jul. *Collinas prox. de Thomar* . . . . . (1) \* **C. calycina** (Hoffgg. et Lk.), Nym.
- { Involuero com as bracteas bastante deseguaes, as externas chegando só a 1/2 das internas ou menos. . . . . 3
- 3 { Capitulos erectos antes da anthese; bracteas do involuero estreitamente escarioso-marginadas, as externas lanceoladas, as internas obtusas; achenios todos, normalmente, com rostro comprido (pouco maior que elles); folhas inferiores lyradas ou roncínadas, pennatipartidas ou pennatifendidas, sinuadas ou dentadas, as caulinares auriculado-amplexicaules; involucros pubescente-tomentosos ou glandulosos ou glabros. Planta erecta ou ascendente, de 2-10 dm., ramosa, glabrescente ou pubescente-aspera.  $\sigma$ . Maio-Jun.

(1) Especie critica, que não tem apparecido nas modernas herborisações.