

*tanum* Desf. var. *tenellum* Willk. Al proponer un nuevo nombre, de acuerdo con el I. C. B. N. (Art. 7) se ha tomado el tipo del epíteto más antiguo.

En las zonas costeras del S de la Península Ibérica en donde confluyen las áreas de *R. tingitana* y *R. intermedia*, se han recolectado individuos que presentan un gran polimorfismo en todos sus caracteres y una gran variación en sus dimensiones. En el presente trabajo se han considerado como híbridos (híbridos interespecíficos), dándoles la denominación de *Reichardia x baetica*.

Los ejemplares más característicos son de pequeño tamaño (3 - 10 cm.), con tallo simple o una vez ramificado, hojas enteras y dentadas, capítulos pequeños con pocas filas de brácteas, de morfología variable y con margen escarioso, presentando en posición subterminal desde una callosidad hasta un mucrón. Dentro de esos individuos de pequeño tamaño se presenta todo un gradiente de variación de una especie a otra en cuanto a la forma de las brácteas, el mucrón de las mismas, la coloración de las anteras y de la base de las lígulas, presentando un porcentaje de esterilidad elevado.

Junto con estos individuos se han recolectado ejemplares de mayor tamaño, con el mismo porte, también con hojas enteras pero en los cuales los caracteres de las brácteas y la coloración de anteras y lígulas ya permanecen constantes y ligados a una de las dos especies parentales.

Finalmente, en las mismas zonas de recolección y ocupando los mismos hábitats, se recolectaron ejemplares en los cuales se observa todo un gradiente de variación en uno y otro sentido, en la morfología de las hojas y el porte de la planta, hasta llegar a individuos morfológicamente iguales a cada una de las dos especies parentales. Estos individuos presentan un tanto por ciento de fertilidad muy elevada.

***Reichardia x canariensis* Gallego & Talavera, hybr. nov.**

*R. tingitana x R. ligulata.*

Perennis. Caule 16 - 39 cm. longo, erecto, leviter ramoso. Foliis basilibus pinnatifidis, coriaceis cum papillis albis, margine cum dentibus spinulosis albis; foliis caulinis bracteiformibus, auriculatis. Pedunculis leviter incrassatis in superiore parte. Anthodio 13 - 15 x (8 -) 13 - 15 mm. cum squamis exterioribus et mediis margine albo-scarioso usque ad 1 mm. lato, mucronatis (0,4 -) 0,7 - 1,5 mm. longis. Ligulis aureis generaliter basi purpurascens. Achaeniis conformibus, tetragonis quadrisulcatis, exterioribus 1,7 - 2 mm. et interioribus 2,5 - 2,8 mm. longis. Pappo 9 - 10 mm. longo.

*Typus.* Inter Tamaimo et Valle de Santiago de Teide, Tenerife, 3.VII. 1951, *Sventenius* (ORT 16126, holotypus).

Perenne, raramente anual. *Tallo* de 16 a 39 cm. *Hojas basales*, pinnatífidas, coriáceas y papilosas, con dientes marginales blanco-espinosos, las caulinares bracteiformes, auriculadas. *Pedúnculos* débilmente ensanchados. *Invólucro* 13 - 15 x (8 -) 13 - 15 mm. *Brácteas* externas y medias con margen escarioso de hasta 1 mm. y mucrón de (0,4 -) 0,7 - 1,5 mm. *Flores* amarillas con base del limbo generalmente púrpura. *Aquenios* homomorfos; los externos de 1,7 - 2 mm. y los internos de 2,5 - 2,8 mm. *Vilano* 9 - 10 mm.

*Hábitat.* Arenas y pedregales de origen volcánico.

*Distribución geográfica.* Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife).

*Localidades estudiadas.*

**Gran Canaria.** Agaete, V.1965, Esteve (Herb. F. Esteve). **Tenerife.** San Andrés, Los Organos, 3.IV.1944, Sventenius (ORT 16093). Entre Tamaimo y Valle Santiago, 3.VII. 1951, Sventenius (ORT 16126).

**Reichardia x sventenia** Gallego & Talavera, *hybr. nov.*

*R. tingitana* x *R. famarae*.

Annua vel perennis; caule 3,7 - 11 cm.; foliis oblanceolatis leviter coriaceis cum papillis albis, margine integro vel cum dentibus spinulosis. Pedunculis leviter incrassatis in superiore parte. Anthodio 9,5 - 15 x 5 - 13 mm. Squamis exterioribus et mediis cum margine albo-scarioso usque ad 1 mm. lato, mucronatis (0 -) 0,3 - 1 mm. longis. Ligulis aureis cum basi purpurascete. Achaeniis conformibus vel diformibus, exterioribus 1,7 - 2,1 mm. et interioribus 2 - 3 mm. longis. Pappo 7 - 7,3 mm. longo.

*Typus.* Roque de Famara (Lanzarote), 14.V.1969, Sventenius (ORT 23058, holotypus).

Anual o perenne. *Tallo* de 3,7 a 11 cm. *Hojas* ligeramente coriáceas, papilosas, con margen entero o dentado, en cuyo caso presentan dientes espinulosos marginales; las basales oblanceoladas; las caulinares de oblanceoladas a bracteiformes. *Pedúnculos* ligeramente ensanchados en su parte superior. *Invólucro* 9,5 - 15 x 5 - 13 mm. *Brácteas* externas y medias con margen escarioso de hasta 1 mm. y mucrón (0 -) 0,3 - 1 mm. *Flores* amarillas con la base del limbo púrpura. *Aquenios* homomorfos, rara vez los internos piramidal-truncados con cuatro costillas lisas; los externos 1,7 - 2,1 mm. y los internos 2 - 3 mm. *Vilano* 7 - 7,3 mm.

*Hábitat.* Fisuras de las rocas o en arenas de origen volcánico.

*Distribución geográfica.* Islas Canarias (Lanzarote y Fuerteventura).