

(1—1½" linearis); involuci squamis summis ineribus dilatatis in appendiculam scariosam, margine erosam, basi purpureo-rectem reflexam; flosculis rubris.

HAB. prope S. Cruz de Tenerife. Link, in Herb. Buch No. 255.

Species a cl. L. de Buch allata, cui cl. Link nomen sine descriptione imposuit; postea latuit in herbario, neque unquam, ut sciām, publicata fuit. Nemini post Buchium in Nivaria visa itaque ulterius querenda. — Specimen unicum loco citato servatur.

74. C. Lippii, L. var.

"Majorera" (i. e. insulae Fuertaventurae incola): soliorum radicalium pinnatifidarum lobis paucioribus rotundatis, obsolete, nec, ut in specie tipo, profunde dentatis; foliis caulinis prae- certim inferioribus solito longioribus.

HAB. prope Puerto Cabras, m. Aprili florens.

Centaurea Lippii vulgaris in Canariis valde leptophylla eadem est ac C. Broussonetii, Willd. Herb. No. 16,528.

Alia ejusdem collectionis species editionis nostrae sub No. 16,615 nomine C. congestae Willd. asservata ad C. melitensis L. formam simplicem vel pauciramosam spectat.

75. Carduus baeoccephalus Webb. var. Bourgaeanus: involuci squatinarum spinis elongatis, — 4" longis, quae in planta typica canaria ½ — 1½" longae, tantum dicuntur, flosculis rubellis, dum huic albi apice purpurascentes tribuuntur.

Alia discrimina stirpium cacterum conformium frustra quaesiūimus.

HAB. in Handiae montibus! — Ibidem, Plaga de Barlovento, locis frigidioribus propè rupes (Bourgeau). Floret Aprili.

C. Bourgaeanus, C. H. Schultz Bip., in Bourg. Pl. canar. exsicc. No. 454.

De vero C. baeocephalo scripsit Webbio inventor Dupréaux: „Espèce très-curieuse. Observez bien ses écailles sépaloides et vous verrez qu'elle diffère de toutes les autres espèces canariennes. Rare; trouvée une seule fois dans les rochers de la Cuesta de Silva, Nord de Canaria. — Ce joli chardon est remarquable par la quantité de ses fleurs blanches, ses écailles calicinales un peu courbées dans l'état frais et sa bonne odeur, qui approche de celle du girofle; enfin son port en général. Je ne l'ai trouvé qu'en montant la Cuesta de Silva, où il tapisse les interstices des rochers dans les endroits les plus escarpés.” — Barranco de la Virgen.

Floruit varietas nostra prope Berolinum in horto cl. Aemilii Bouché e seminibus canariensis.

76. Crepis foetida, L. var.

Gomeraea: pusilla, semipedalis vel humilior, e basi ramosa; ramis divaricatis areuatim adscendentibus, demum erectis setosis; foliis infimis lanceolatis sinuato-dentatis, superioribus profundissime runcinato-pinnatifidis lobis productis dentibusque

acutissimis, parce setosis; pedunculis elongatis simplicibus vel bifidis subnudis glandulos-pilosis monocephalis; capituli ligulis inferne apicem versus rubris.

HAB. in Gomerae montosis supra vicum Hermigua.

Habitus speciei propriae, quam diu esse credimus. Cultura per plures annos hucusque constans, nana, dum Crepidia foetidae typus per Nivariam Canariamque vulgatior in altitudinem binarum pedum excrescere solent.

77. Picridium ligulatum Vent.

Picridio ligulato facile pil polymorphius in Canariis. Sicut in stationibus diversissimis vegetans, tum Fortunatarum occidentalium scopulos maritimos ventis humidis perslatos, tum in insulis libycae indolis Lanzarote et Fuertaventura, (probabiliter et in proximo Sahareo littore, quum et planta Mogadorensis, sit) deserta campestria saxaque aridissima incolit, ita et formas varias per multas induere solet. Varietatis quatuor a cl. C. H. Schultz Bip. egregio expositis addimus sequentem:

a. var. grandiflorum robustum; rosulis amplis subcaulinibus dense foliatis; foliis acutissimis; velut in forma 3 crispa, margine conserte et inaequaliter sinnato-dentatis; pedunculis abbreviatis, sat dense squamatis; anthodiis maximis.

HAB. in Handiae montibus borealibus supra Cofreto. Floret Aprili, cum Ilicifolio, dum in Palma varietatem crispatam sero autumno adhuc floridam observavimus.

Varietas ilicifolia, hucusque in Lanzarotes jugo Famarae tantum obvia, in Handiae sterilibus demissioribus, ubi radices lignosas ipsa planta duplo et triplo longiores arenas lapidosa immixtis, forma occurrit, quam facile subvarietatem obtusatam dicas quicunque ita definiri potest:

Pygmaeum, foliis spatulatis, apice rotundato-obtusissimis, margine leviter sinuato-dentatis, brevissime apiculatis; pedunculis brevissimis subnudis vel parcius squamatis.

Forma 4 pinnatifida Phytographiac canariensis crescit et Gomerae in angusta et a mare remota valle Barranco de la Laja.

78. Picridium vulgare, Desf., Fl. atl. II, p. 221.

HAB. abunde in herbidis insularum facile omnium. Gomera, el Risco de Tagamiche, Lanzarote prope Guatiza, Bourgeau. Teneriffa, in valle Tajodio prope S. Cruz.

Floret Januario — Aprili.

79. Rhabdotheca diyaricata (Desf.), Webb. var.

Subnudicaulis: foliis latioribus subintegris vel margine lobatis neque runcinatis, apice obtusatis, caule erecto subsimplici ac subnudo.

HAB. in Fuertaventura prope Puerto-Cabras, m. Aprili florens.

Transitum quondam inter Rhabdothecam diyaricatam, canariensem et Lactucam nudicaulem, Murr. caboverdicam indicare videtur.