

Rh. longiloba. *Zollikoferia longiloba*, Boiss.
Reut. *Atal. longilobus*, Pom.

— **pumila.** *Zoll. pumila*, DC.

— **resedifolia.** *Zoll. resedifolia*, Coss. *Rhabd. chondrilloides*, Sch. bip.

— **candolleana.** *Zoll. candolleana*, Coss.

— **angustifolia.** Sch. bip. *Zoll. angustifolia*, Coss. (Desf. sub. *Sonchus*).

— **quercifolia.** *Zoll. quercifolia*, Coss. (Desf. sub. *Sonchus*.)

Peut-être suis-je allé trop loin en réunissant en un seul genre les deux types assez distincts de cet ensemble d'espèces. Dans ce cas, les trois premières resteront des *Atalanthus*, le nom de Don étant antérieur à celui de Lessing.

Rhabdotheca tenuiloba.

Calathides ovoïdes après l'anthèse, solitaires sur des pédoncules étalés, à bractéoles squammiformes, folioles du péricline embriquées décroissantes, lancéolées, les externes atténuées en pointe calleuse, non appliquée. Akènes grêles, longs de 4^{mm}, les extérieurs velus, les intérieurs à côtes non striées. Aigrette appauvrie, à soies raides bien plus longues que les autres. Feuilles pennatifides à rachis et lobes étroits linéaires, simples ou dentées, à pointe calleuse; les caulinaires de plus en plus petites embrassantes, à oreilles incisées recourbées en arrière. Tige raide, droite, rameuse dans le haut, naissant d'une souche pérennante grêle. — Fl. avril.

Sables des oasis : Ksar Metlili.

Rhabdotheca squarrosa.

Calathides solitaires brièvement pédonculées. Péricline globuleux à folioles sinuées, régulièrement croissantes; les

extérieures ovales lancéolées, acuminées en longue pointe étalée, blanche un peu calleuse au sommet; les plus intérieures oblongues, membraneuses aux bords et au sommet presque contracté en pointe obtuse ciliolée. Akènes Feuilles radicales nombreuses, pétiolées, pennatifides, à rachis très étroit et denté, ainsi que les lobes distants linéaires, terminés en pointe blanche calleuse; les caulinaires semblables, sessiles, auriculées embrassantes, la supérieure bractéiforme. Racine verticale annuelle ou indurée subperennante. (Feuilles du *R. angustifolia*; calathides égalant celles de *R. quercifolia*). — Fl. avril.

Sables des oasis : Ksar Metlili.

Taraxacum getulum.

Scapes courts; péricline grand à folioles extérieures étroitement lancéolées, appliquées, pubérulentes au sommet; les intérieures linéaires, presque aussi larges, obtuses peu ou point calleuses au sommet. Akènes gris comprimés, oblancéolés, à costules lisses dans le bas, ou tuberculées dans les plus extérieurs, muriculées dans le haut à spinules égales ascendantes, fortement dépassées par le rostre. Scape de l'aigrette presque deux fois long comme l'akène et comme l'aigrette, un peu claviforme au sommet, long de 7^{mm}. Feuilles étalées roncinées à lobes lancéolés peu inégaux, dentelés çà et là, très récurves. Plante glabre. — Fl. avril.

Terrains sablonneux de la région des Ksours : Arbaouat.

Erratum de la page 9 : c'est le *T. dens-leonis* ou plutôt *officinale* Wig., que je n'ai point encore vu de l'Algérie; le *T. laevigatum* au contraire, ou une de ses formes à akènes plus grands, à aigrette plus longuement stipitée, se retrouve jusque dans la région des cèdres de Blida et de l'Aurès.

Phoenicopus intricatus (ou *Lactuca intricata*)

Péricline égalant l'aigrette, à folioles extérieures courtes