

Rh. longiloba. *Zollikoferia longiloba*, Boiss.
Reut. *Atal. longilobus*, Pom.

— **pumila.** *Zoll. pumila*, DC.

— **resedifolia.** *Zoll. resedifolia*, Coss. *Rhabd. chondrilloides*, Sch. bip.

— **candolleana.** *Zoll. candolleana*, Coss.

— **angustifolia.** Sch. bip. *Zoll. angustifolia*, Coss. (Desf. sub. *Sonchus*).

— **quercifolia.** *Zoll. quercifolia*, Coss. (Desf. sub. *Sonchus*.)

Peut-être suis-je allé trop loin en réunissant en un seul genre les deux types assez distincts de cet ensemble d'espèces. Dans ce cas, les trois premières resteront des *Atalanthus*, le nom de Don étant antérieur à celui de Lessing.

Rhabdotheca tenuiloba.

Calathides ovoïdes après l'anthèse, solitaires sur des pédoncules étalés, à bractéoles squammiformes, folioles du péricline embriquées décroissantes, lancéolées, les externes atténuées en pointe calleuse, non appliquée. Akènes grêles, longs de 4^{mm}, les extérieurs velus, les intérieurs à côtes noustrées. Aigrette appauvrie, à soies raides bien plus longues que les autres. Feuilles pennatifides à rachis et lobes étroits linéaires, simples ou dentées, à pointe calleuse; les caulinaires de plus en plus petites embrassantes, à oreilles incisées recourbées en arrière. Tige raide, droite, rameuse dans le haut, naissant d'une souche pérennante grêle. — Fl. avril.

Sables des oasis : Ksar Metlili.

Rhabdotheca squarrosa.

Calathides solitaires brièvement pédonculées. Péricline globuleux à folioles sinuées, régulièrement croissantes; les