

718. *MACROSTOMA*. Involucri bracteæ herbaceæ, immixtæ. Pappi paleæ 1-2 radiis 8-10, in aristam sublongam v. plumosam productam. Herba, foliis plerumque radicalibus integris v. pinnatifidis. Capitula in sæpis aphyllis v. pedunculatis longis solitaria. Corolla fœm.—*Amer. bor. merid. et austr. austrorip., Austral., Nov. Zel.*

719. *KUATA*. Involucri calyptrati bracteæ parvæ, membranaceæ herbaceæ, immixtæ. Achenia 22-costata. Pappi paleæ 2-3, minime, cum setis totidem alternatis, radiis 6. Herba, foliis plerumque radicalibus integris dentatis v. lyratis. Capitula parva, in sæpis aphyllis v. pedunculatis longis solitaria. Corolla fœm.—*Amer. bor.*

720. *PALMACHOSTOMA*. Involucri calyptrati bracteæ membranaceæ, demum mucrono-dilatate. Achenia compressa, vix costata, calva. Herba, foliis radicalibus integris. Sæpi aphylli, 1-cephali. Corolla fœm.—*California.*

721. *ANOSOMUM*. Involucri subcalyptrati bracteæ angustæ, demum incrassato-carinate. Achenia 8-10-costata, calva. Herba, foliis radicalibus rosulatis integris densatis. Sæpi aphylli, 1-cephali v. in ramos 1-cephalos divisi, basi tenues, superne ampliatæ ovipæ. Capitula parva. Corolla fœm.—*Eur.*

722. *HYSSOCUM*. Involucri bracteæ interiores breviter herbaceæ, demum incrassato-comæte. Achenia compressa v. 3-alata, pappi paleæ angustis aristata acutis setis exterioribus tenuissimis mucronis, raris calva. Herba, foliis radicalibus pinnatifidis. Sæpi aphylli, 1-cephali, demum sæpis ampliatæ ovipæ. Corolla fœm.—*Eg. Mediterr., Eur. merid.*

723. *YALATA*. Involucri bracteæ interiores angustæ, demum coriando-comæte, exterioribus subulnibus lanugos v. levis. Pappi squamulis adactis cum setis 2-10. Herba ramosa, pinnatifida, foliis integris densatis pinnatifidis. Capitula late pedunculata v. longe pedunculata. Corolla fœm. v. interiora fœm exterioribus radiatis fœm.—*Eg. Mediterr., Ind. Ceyl.*

Subtribus 4. *LAPIDARIA*. Herba ovata, foliata. Involucri basi v. vix calyptrati bracteæ sub-pappalis. Achenia apice alata v. mucronata, calva.

724. *HETEROMALLA*. Involucrum dense longe demum actuosum. Receptaculum alio alveolato. Herba ovata bipecta. Capitula pedunculata. Corolla interiores fœm, exterioribus radiatis fœm.—*Præsi, Hesper.*

725. *LAPIDARIA*. Involucrum glabrum. Receptaculum nudum. Achenia oblonga, compressivata, multicosata. Herba glabra v. pilosula. Capitula parva, late pedunculata. Corolla fœm.—*Hesper. bor. orbis interior, in aliis locis ovipæ.*

726. *ANOSOMUM*. Involucrum glabrum. Receptaculum nudum. Achenia ovata, 8-10-costata. Herba glabra. Capitula parva, graciliter pedunculata. Corolla fœm.—*Amer. bor.*

Subtribus 5. *RHAGADIALIS*. Herba sæpis ovata, ramosa, pinnatifida. Involucri basi v. breviter calyptrati bracteæ sub-pappalis, basi demum coriando-comæte v. incrassato-indehæte. Achenia apice alata v. mucronata, raris mucronata, pappi oviformi v. breviter paleosæ raris aristis setis brevibus mucronata. Corolla fœm.

Exempta: Pappus mucosus densè in *Rhagadialis* parva.

Involucri bracteæ vix mucronata in *Kilipais*.

727. *KLARANTA*. Involucri bracteæ vix demum ovata. Achenia linearia, elongata, incurva, demum stellato-patentia, demum mucronata, aristis tenuissimis stellato-patentibus mucronata.—*Eur. austrorip., Asia merid. et merid., Afr. bor.*

728. *RHAGADONIA*. Involucri bracteæ demum ovatae incrassato indehæte. Achenia angusta, stellato-patentia v. mucronata. Pappus exterior brevissimus paleosæ raris 6, interioris setis basi paleosæ v. 6.—*Eg. Mediterr., Orissa.*

729. *HETEROMALLA*. Involucri bracteæ demum indehæte submucronata. Achenia exteriora orbiculato-indehæte, mucronata, mucronata, pappi 8 v. subulnata, interiora ovata, longirostrata, pappi leviter 22-setis.—*Præsi, Affghan.*

730. *ACANTHOCENTRALIS*. Involucri demum ovata v. globosi bracteæ acutæ, mucronata, indehæte, demum mucronata. Achenia angusta mucronata, pappi parvi paleosæ.—*Ind. Affghan.*

731. *ZACINTHA*. Involucri demum orbiculato-globosi bracteæ indehæte, mucronata. Achenia oblonga, apice mucronata, mucronata, setis 22 levibus subulnatis mucronata.—*Eg. Mediterr.*

Subtribus 6. *CYRIPIDIS*. Herba parvas v. ovata, basi sæpis foliata raris squamiformi, pileo non stellato vix lanosa. Involucri bracteæ interiores 1-2 aristis, æqualis, basi sæpis demum mucronata.