

les bords, couvertes de poils courts; celles de la tige entières et étroites. Fleurs petites, jaunes, terminales.—Fleurit en été. Croît dans les provinces méridionales de la France. N° 1.

ESPÈCES CONNUES.

1. *RHAGADIOLUS stellatus*, Gærtn. R. calycibus fructus undique patentibus; radiis subulatis, foliis oblongis indivisis dentatis. *Lam. Enc. 3*, p. 415. * Sub lampsanâ rhagadiolo. *Ejusd. Illust. pl. 655, f. 2.* *Lapsana stellata*. *Lin. Hab. in Gallia australiori*, Italia. ④
2. *R. lampsanæfolius*, Tournef. R. calycibus fructus undique patentibus, radiis subulatis, foliis pinnato-lyratis, obtusissimis. *Lam. Enc. 2*, p. 415. Sub lampsanâ rhagadiolo ut. *Lin. Hab. in Oriente, Carniola*. ④
3. *R. kolpinia*, Willd. sp. pl. 33, p. 1626. L. calycibus fructus undique patentibus, radiis subulatis lœvibus, semi-nibus echinatis, foliis linearibus integerrimis. *Lam. Enc. 3*, p. 416* Sub lampsanâ ut. *Lin. fil. Rhagadiolus*. *Lam. Illust. pl. 655, fig. 1.* *Koelpinia*. *Pall. It. 3*, p. 755, t. L, l. f. 2. *Hab. in Tataria, Daouria, et in Peru*. ④

SECTION DEUXIÈME.

Réceptacle nu. Graine surmontée d'une aigrette à poils simples.

GENRE TROISIÈME.

LES PRENANTHES; *prenanthes*.

Les prenanthes ont des rapports très-marqués avec les lampsanes, mais paroîtroient plutôt devoir être réunis avec les chondrilles,