

β Achaines terminés en bec.

544. RHYNCHOPAPPUS (RHYNCHOPAPPE). *Crepis* Gr., G. — Ach. à côtes ou à stries, atténués en bec, avec aig. de poils. Clinanthe velu ou fibrilleux. Péricline à folioles 2-séries.

- | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Corolles toutes jaunes en dessus et en dessous. 1630. R. albidus. |
| | Corolles de la circonférence jaunes en dessus et purpurines en dessous. 2 |
| 2 | Stigmates bruns. 1628. R. cinereus. |
| | Stigmates jaunes. 1629. R. foetidus. |

* *Achaines de la circonférence à bec moins long.*
— *Achaines à 10 côtes.*

1628. R. cinereus (R. cendré). *C. cinerea Desf.; C. taraxacifolia Thuil.; Gr., G.* — Feuil. hispides ; les caulinaires 2-auriculées. (2). Mi-Jn.

Prés, vieux murs : Tarbes, Bagnères (*Corb.*). CCC.

== *Achaines à stries.*

1629. R. foetidus (R. fétide). *C. foetida L.; Gr., G.* — Feuil. caulinaires 2-auriculées. (1). Jn-At.

Lieux stériles, champs (*Ph.*). C.

** *Achaines tous à bec également long.*

1630. R. albidus (R. blanchâtre). *C. alpina Vill.; Gr., G.* — Feuil. poilues ; les caulinaires linéaires-lancéolées. (2). Jn-At.

Montagnes : St-Justin, Ereslids (*Corb.*) ; Barèges (*Gr., G.*) ; Gèdre, Gavarnie (*Ph.*) CC.

545. PTEROTHECA (PTÉROTHÈQUE) *Cass.; Gr., G.* — Ach., — à la circonférence, à 4 côtes ou ailes, — au disque, subcylindriques, en bec au sommet, — avec aig. de soies capillaires. Clinanthe simbrillifère. Péricline à folioles ext. en calicule.

1631. P. nudicaulis (P. nudicaule). *Andryala nudicaulis Lam.; P. nemensis Cass.; Gr., G.* — Feuil. oblongues, lyrées ou dentées. Fl. jaunes ; corymbe. (1). Mi-Jn.

Prés, champs : Lascazères, Vic, Tarbes (*Corb.*) ; Gazost (*Ph.*). R.

546. LACTUCA (LAITUE) *L.; Gr., G.* — Ach. planconvexes, à 4-× côtes sur les faces, à bec capillaire, à aig. de poils 4-séries. Péricline à folioles ×-séries.