

*Senecio leucanthemifolius*: assai scarso e disperso; anche qui nella varietà del Toro, ma in una forma ridotta, e, per le foglie profondamente incise, più vicina alla var. *pinnatifidus*-che non la pianta del Toro.

\* \* \*

Chiudiamo la relazione della gita con le descrizioni delle nuove entità alle quali abbiamo accennato:

LOBULARIA MARITIMA Desv. f. VIOLACEA Pamp., f. n.

*Flores violacei.*

SENECIO LEUCANTHEMIFOLIUS Poir. var. PLAYPHYL-LUS Pamp., var. n.

*Caulis circ. 4 dm. altus, validus, striato-angulosus, fistulosus; folia carnosula, omnia pennato-lobata usque fere pinnatifida, lobis vel lacinis latis, rotundatis, semper integris; capitula numerosa.*

Folia carnosula, capitula numerosa et squamae squamulaeque ut in var. *pinnatifido* Fiori cui proxima.

f. TAURINUS Pamp., f.n.

*Caulis 2-2½ dm. altus, exilis; folia inferiora parce dentata, caetera lobis vel lacinis irregulariter hinc inde vix et obtuse inciso-denticulatis.*

Statura et foliorum lobis vel lacinis margine non integro ad var. *pinnatifidum* quam genuina magis vertit, sed coeteris characteribus var. *platyphyllo* pertinet.

f. VACCINUS Pamp., f. n.

*Caulis 1-2 dm. altus, validus; folia omnia profunde pinnatifida lacinis irregulariter plus minusve sinuatis sed integris.*

Statura et folius manifeste pinnatifidis ad var. *pinnatifidum* ut f. *taurinus* vertit, sed foliorum lacinis integrerrimis var. *platyphyllo* pertinet.

ROBERTIA TARAXACOIDES DC. var. TAURINA Pamp. var. n.

*Major et saepe gigantea; scapi plures, 2-3 dm. et ultra (usque 6 dm.) alti, erecti; folia sub anthesi scapis subaequantia et saepe eos superantia, segmentis lateralibus latis, triangularibus, saepe irregulariter dentatis; capitula 5 cm. lata.*

In tipo: scapi (saepe autem scapus unus) prostrato-ascendentes (2) - 7 - 15 - (20) cm. alti; folia scapis circ. dimidio breviora, segmentis lateralibus angustis, integris; capitula 15-20 mm. lata.