

crassioribus brevioribus arctè revoluto-subcircinnatis apice longissimè et divaricatim bipartitis.

Hab. in aridis provinciæ *derbidjan* (Aucher N° 4875), in argillosis salsis propè *Teheran* (Kotschy N° 60).

Plantula nana cujus specimina prorsùs acaulia habitu *Plantaginem Creticam* referunt. Folia 8-10 lin. longa basi lineam lata, capitula illis *K. linearis* minora. A *Kælp. linearis* eximiè distincta foliis multò brevioribus pro longitudine latioribus, capitulis sessilibus nec longè pendunculatis, acheniis dimorphis præter aculeos dorsales non scabridis.

ROBERTIA TENUIFLORA Boiss.

R. foliis omnibus radicalibus oblongo-linearibus sub lente parcè setosis viridibus runcinato-pinnatilobatis lobo terminali majori, scapis tenuissimis folia vix duplò superantibus supernè squamulis paucis ob-sitis, capitulis parvis paucifloris, involuci phyllis planis albo-puberulis nigricantibus albomarginatis infernè longè et parcè crinitis ab exterioribus ad intima elongatis paucis, ligulis concoloribus, receptaculi paleis membranaceis linearì-acuminatis achenia superantibus, acheniis transversè rugosis breviter attenuato-rostratis, pappi plumosi setis basi vix dilatatis.

Hab. in insulà *Cretâ* ubi legi cl. Prof. Raulin.

Planta bipollicaris, folia eis *R. taraxacoidis* minus profundè divisa vix sesquipollicaria, scapi eis hujus duplò tenuiores, capitula minora; ab eâ insuper differt phyllis inæquilongis nec æquilongis exactèque uniserialibus, acheniis apice breviter attenuatis. Hæc planta habet faciem *Deloderii* sed hoc subgenus ab eâ differt receptaculo subnudo, acheniis longè rostratis, pappi setis paucis basi paleaceo-dilatatis, plurimulis deciduis.

HAGIOSERIS Boiss.

Capitulum multiflorum. Involuerum biseriale squamis exterioribus linearibus patulis interioribus incurvis convoluto-cymbiformibus achenia radii foventibus apice longè acuminatis tandem deciduis. Receptaculum nudum. Achenia teretiuscula transversè rugosa exteriora valdè incurva pappo brevissimo coroniformi fimbriatulo superata interiora