

constricta nec autem rostrata, glaberrima, in sectione transversali irregulariter oblonga, undulata, sed costis haud manifeste prominentibus; pappus 4–5 mm longus, albus, ante maturitatem fructus non deciduus, radiis seriebus 2–3 cellularum compositis, pilis pappum cingentibus nullis.

A f g h a n i s t a n : SW: Ghorat: In declivibus borealibus Kuh Cheling-Safed-Daraq a Parjuman meridiem versus, 2600–2800 m, RECH. 19074!

Distr. gen.: Endem.

5. *S. amaurophyton* PODLECH. & RECH. f., sp. nov.

Icon.: Tab. 143.

Typus: PODLECH 19085, M!

Herba verisimiliter perennis, pumila, glabra, tenera, collo pluricipiti. Caules floriferi 6–10 cm longi, pallidi, internodiis omnibus valde elongatis, a basi in ramos paucos tenues flexuosos a basi fere remote capituliferos divisi. Folia ut videtur in vivo subcarnosa, glaucescentia, in sicco crassiuscule membranacea, majora omnia prope basin subrosulato-congesta, 15–30 × 3–6 mm, subsessilia, lanceolata, sinuato-dentata vel sublobata; folia caulina jam inferiora valde diminuta lanceolata, sessilia, acuta, non decurrentia, superiora capitula fulcrantia lineari-lanceolata, valde reducta, acuta, subsquamiformia. Capitula plerumque triflora, in axillis foliorum diminutorum subsessilia, remotissime subracemose disposita et ad extremos caules et ramos terminalia, squamulis nonnullis in involucri phylla exteriora transeuntibus suffulta. Involucrum 6–7 × 1–1,5 mm, angustissime cylindricum, glabrum, pallide viride cinereo-violascens; phylla laxiuscule imbricata, angustissime pallide marginata; exteriora lineari-lanceolata, quam interiora plerumque subtriplo breviora, acutiuscula vel obtusiuscula, rarius longitudine in interiora ± transeuntia; intima linearia, obtusiuscula, maturitate demum apice divergentia usque subrecurva. Ligulae (in statu emarcido) ut videtur involucre dimidio circiter longiores, sordidae. Achaenia ± 3 × 1,2 mm, compressa, basin versus longius, apicem versus breviter attenuata, ibique minutissime antrorse setuloso-ciliolata, brunnescentia, indistincte minute atrius maculata, utrinque 7-costata, costis lateralibus magis prominentibus, apice abrupte in rostrum pallidum achaenium aequans attenuata; pappus ± 3 mm longus, albus, facillime dehiscens.

A f g h a n i s t a n : C: Ghorat: In parte summa vallis Lal prope Dahane Bum ad viam Panjao – Lal, 2950 m, 31. VII. 1970, PODLECH 19085!


Distr. gen.: Endem.

Diese merkwürdige Art wurde von ihrem Entdecker, D. PODLECH, als neu erkannt. Die Beschreibung wurde von RECHINGER verfaßt. Die Art unterscheidet sich, abgesehen von ihrer zwerghaften Statur, von allen hier behandelten Arten der Gattung vor allem durch die nicht herablaufenden Stengelblätter.

26. *Cephalorrhynchus*

Cephalorrhynchus BOISS., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser. 1, 4: 28 (1844).

Syn.: *Lactuca* sect. *Scariola* HOFFM. in ENGLER & PRANTL, Natürl. Pflanzenfam. IV,



Scariola amaurophyton PODLECH & RECH. f. — PODLECH 19085; fructus $\times 6$