

## III. Schlagintweitia.

Involucrum biseriale, bracteis cinctum, receptaculo nudo multifloro. Achenium prismaticum, basi attenuatum, 10costatum, costis 5 prominulis, erose, apice annulo pappifero cinctum, pappo piloso rigente rufescens-albo.

Genus, quod fratribus Schlagintweit dico, ut eorum observationes Floram alpinam illustrantes agnoscam, ab Hieracio involueri fabrica habituque strenue distinctum est.

1. *S. intybacea*. — *Ic.* Vill. delph. 3. t. 31. dextr. — *Syn. Hieracium intybaceum Wulf.* (1778). *H. albidum* Vill. (1779). — Specim. german. (Styr., Carinth., Salisb., Tyrol.; legi in m. Fimberjoch alt. 6—7000' substr. micasch.), helvet. (legi in m. Bernina), gallic. (m. Hoheneck Voges.: Mougeot). — Caulis 1—oligocephalus, cum foliis et involueri serie exteriori ubique glandulosus; folia oblongo-linearia, attenuato-obtusiuscula, basi lata sessilia, ima squamacea: involucrum bracteis foliaceis cinctum, squamis uliusque seriei lanceolato-linearibus obtusiusculis; ligulae ochroleucae!, glabrae; stylus fuligineus; achenia rufo-atra, 2" longa.

Alpes a Styria ad Delphinatum, Vogesorum m. Hoheneck et Pyrenaei (Gren.), alt. 3000'—7000'.