

Chondrilla, hieracioides, foliis caulinis pinnato-mutifidis, pedunculorum bracteis aculeiformibus, floribus sub-corymbosis, pappo sessili subplumoso. Roth Catalog I. p. 101.

Caulis erectus, teres, laevis, glaber, ramosus tripedalis. Rami alterni. Folia laevia, glabra, alterna: radicalia caulinaque pinnatifida: lacinias linearibus acutis: suprema lanceolata integerima: radicalia inferiora qu petiolata: reliqua sessilia. Rami apice trichotomi: pedunculo intermedio indiviso: laterales trifidi Bractae patulae lineares. Calycis squamae inferiores lineares patulae. Corollae flavae. Pericarpia striata: pappo persistenti denticulato. Flores magnitudine Crepidis variae.

h. H. Annua.

Pappus paleaceus.

CICHORIUM, *pumilum*, caule subflexuoso, foliis caulinis oblongis semiamplexicaulibus, floribus sessilibus. Jacquin. Obs. IV. p. 3. icon. t. 80.

h. H. Annum.

Pappus setaceus.

S C H M I D T I A.

Calyx oblongus: foliolis aequalibus linearilanceolatis: basi auctus foliolis minimis calyce adpressis. Corollulae lineares truncatae quinque-dentatae hermaphroditae numerosae. Stamina quinque. Stylus unus. Stigmata duo reflexa.

Peri.

Pericarpia subtetragona striata glabra. Pappus setaceus persistens denticulatus. Receptaculum nudum serobiculatum.

— *fruticosa*, caule fruticoso, foliis perennantibus lanceolatis dentatis glabris, pedunculis ramosis terminalibus, sub flore squamosis.

Caules plures subrecti teretes glabri laeves ramosi. Rami alterni. Folia laevissima in petiolum decurrentia crassa. Pedunculi teretes glabri sub flore tomentosū bi-trifidi.

Calyx cylindricus foliolis 12 — 20, corollulis brevioribus aequalibus, subtomentosis. Corolla luteae. Pericarpia fusca. Pappus conformis setis 10 — 12 aequalibus, longitudine pericarpii. h. in frigidario. Frutex.

In Memoriam Cl. Schmidtii Auctoris florae Boemicae dixi.

P a p p u s d i f f o r m i s .

HYOSERIS, *incrassata*, pedunculis incrassatis, foliis oblongis, dentatis acutis, calycibus glabris.

Hyoseris Hedypnois Linnaei.

Lapsana calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus nutantibus.

Linn. Hort. Ups. 246. n. 4.

Caulis striatus, glaber, ramosus, subrectus. Folia sessilia: ima obovata: ramea oblonga: utrinque glabra, nervis subtus margineque scabris. Pedunculi glabri sub flore incrassati, striati, fistulosi. Calyx ovato-cylindricus, laciniis laevissimis.

Peri-