

## TRIBUS III. CICHORACEAE.

(Vaill.; Juss. gen. pl. 168; Don in Edinb. philos. Journ. N. 12. 1829. p. 305; Linnæa V. 132. *Lactuceae* Cass.)

Capitula radiatiformia, homogama, aequaliflora, nunquam dioica. Stylus superne cylindræus, superne ramique magis minusve longi, aequaliter pubescentes, ramis obtusiusculis. Stigmatis series prominulæ, angustæ, ante medios styli ramos desinunt nec uspiam conflunt. Corolla lingulata, quinquedentata, quinquenervia, nervis ad basin dentium et lingulæ bifurcatis igiturque lingula sexnervia. Pollen seabrum multangulatum (pl. dodecaëdram).

*Plantæ lactescentes, pleraque boreales vel alpinæ vel Europææ foliis alternis; capitulis pl. luteis,*

### SUBTRIB. I. SCOLYMEAE.

Rhachis bracteolata. Pappus coroniformis aut paleaceus, aut si multiserialis, serie saltem extrema paleacea.

1. *SCOLYMUS* Cass. Dict. sc. nat. XXV. 60; XXXIV. 86. (*Scolymi* sp. L.) Achaenium brevissime rostratum, pappo coroniformi coronatum. — *Herba annua, spinosa, facie Cardui, incola regionis Mediterraneæ.*

*Sc. maculatus* Desf. = *Sc. pectinatus* Cass.

2. *MYSCOLUS* Cass. Dict. sc. nat. XXV. 60, XXXIV. 83. Achaenium bracteola inclusum, erostre, paleis binis angularibus, aequalibus, longis, una alterave breviori accedente, coronatum. — *Herbæ perennes, spinosæ, incolæ regionis Mediterraneæ.*

*M. megacephalus* Cass. = *Scolymus grandiflorus* Desf. et *M. microcephalus* Cass. = *Scolymus hispanicus* Desf.

### SUBTRIB. II. LAMPSANEAE.

Rhachis ebracteolata. Achaenium calvum.

1. *LAMPSANA* Vaill., Juss., (*Lapsana* L.) Achæ-