

L. communis. (Gemeiner R.) *L. comune*.

Foglie ovate picciolate angolato-dentate, peduncoli tenui ramosissimi. *Pers. Syn. II p. 348. Röhl.*

germ. II p. 416. Schult. aust. II p. 454.

Lampsana. Zann. Ven. p. 159.

Lapsana Dodonaei. Bauh. Hist. II p. 1028.

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

CICHORIUM. (Wegwarte) *Cicorea*.

Calice calicolato: Ricettacolo quasi paleaceo: Pappo polifillo paleaceo.

C. Intybus. (Gemeine W.) *C. comune*.

Fiori ascellari gemelli, quasi sessili, foglie runcinate. *L. Pers. Syn. II p. 379. Röhl. germ. II p. 434.*

Schult. aust. II p. 399.

C. sylvestre s. officinarum. Zann. Ven. p. 65.

C. sylvestre et sativum. Bauhin. Hist. II p. 1007 cum icone.

Cichorea selvatica. Matth. p. 532 icon.

β *C. alba*, Fiori bianchi. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente nei luoghi montuosi e sassosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

SCOLYMUS. (Golddistel) *Scolimo*.

Calice imbricato spinoso, circondato da foglioline spinose. Ricettacolo paleaceo, Pappo o.

S. aggregatus. (Gehäufter G.) *S. ammucchiato*.

Fiori ammucchiati, semi papposi.

S. hispanicus. *Pers. Syn.* II p. 380. *Savi Bot. Etrusc.*

S. chrysanthemos. *Zann. Ven.* p. 240. t. 175.

Spina lutea. *Bauh. Hist.* II p. 84.

Nasce in tutte le Spiagge arenose, e specialmente in quella del Lido; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

†† *Floribus flosculosis.*

CARTHAMUS. (Saflor) Cartamo.

Calice imbricato con squamme subovato-fogliacee.

Ricettacolo paleaceo-setoso. Pappo paleaceo.

C. lanatus. (Wolliger S.) *C. lanuto*.

Fusto lanoso, foglie inferiori pennatofesse, dentate, quelle della sommità abbraccianti il fusto pennatofesso-dentate spinose. Pers. Syn. II p. 380. Röhl. germ. II p. 435.

Trovasi, benchè di rado, in Campalto nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

ARCTIUM. (Klette) Personata.

Calice globoso con squamme uncinatae. Ricettacolo paleaceo. Pappo setoso-paleaceo.

A. glabrum. (Glatte K.) *P. glabra*.

Foglie del fusto cuoriformi picciolate, dentellate, calici glabri. A. Lappa. L. Pers. Syn. II p. 383.

Röhl. germ. II p. 456. Schult. aust. II p. 457.

Lappa major s. Arctium Dioscoridis. Zann. Venet. p. 160. t. 257.