

Habitat in Virginia, Canada. Kalm.

*Folia radicalia plurima, lyrata: lobis rotundatis, glabris. Caules subnudi, erecti, striati. Folio uno altero-
ve lanceolato, integro amplexicanli. Ramis paucis.
Rami terminantur Pedunculis tribus, ad quorum ex-
ortum folia 2, lanceolata, opposita: altero minore. Ca-
lyx in 12 folia ad basin divisus, aequalis, corolla bre-
viora. Flores saturate lutei. Habitus Arnicæ gerde-
riæ. Pappus plumosus non est, nec stipitatus, sed sim-
plex. Statura Hyoseridis; Calyx Tragopogonis. Semi-
na Hieracii.*

detachabil. 6. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus in-
ermibus, foliis lyrato-finnatis. Hort. upf. 244. Hort.
cliff. 382. * Sant. monsp. 295.

Chondrilla foliis cichorei tomentosis. Baub. pin. 130.

Chondrilla prior. Cluf. hist. 2. p. 143.

Habitat in Hispania. ♀

picridis. 7. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus acu-
leatis, foliis pinnato-hastatis. Hort. cliff. 382.

*Picris calycibus simplicibus aculeatis, foliis inerviis
hastato-finnatis. Hort. upf. 241. Sant. monsp. 295.*

*Sonchus asper laciniatus creticus. Baub. pin. 124. prodr.
60.*

*Hieracium majus, folio sonchi, semine incurvo. Baub.
pin. 127.*

*Chondrilla cretice nomine missa, semine criso. Baub.
hist. 2. p. 1022.*

Habitat in Creta, Monspeli. ◎

asperum. 8. TRAGOPOGON calycibus corolla brevioribus hi-
spidis, foliis integris: caulinis oblongis. Sant. monsp.
82.

*Sonchus asper, subrotundo folio, major & minor. Baub.
pin. 124. prodr. 60.*

Habitat Monspeli.

SCORZONERA.

humilis. 1. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis ner-
volis platis. Hort. cliff. 382. Fl. suec. 647. Mat-
med. 371.

*Scorzonera humilis latifolia nervosa. Baub. pin. 275.
Scorzonera humilis latifolia pannonica. Cluf. hist. 2. p.
138.*

Habitat in Europa septentrionalioris pratis apertis. ♀

2. SCOR-

I. *POLYGAMIA ÆQUALIS.*810. TRAGOPOGON.* *Vaill. A.G. 1721. 44. 13.*21. 14. *Tournef. 270. Tragopogonoïdes Vaill.*
*A.G. 1721. 43. 15. 14.***CAL.** *Communis* simplex, octophyllus : *foliolis* acuminatis, æquibus; *alternis* interioribus; *amnibus* coartatis basi.**COR.** *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis* hermafroditis multis, *exterioribus* paulo longioribus.*Propria* monopetala, ligulata, truncata, quinque-dentata.**STAM.** *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.**PIST.** *Germen* oblongum, infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, revoluta.**PER.** nullum. *Calyx* connivens, acuminatus, longitudine seminum, ventriculosus.**SEM.** solitaria, oblonga, utrinque attenuata, angulata, scabra, ripite subtilato, longo, pappigero terminata. *Pappus* plumosus, planus, radis circiter triginta duobus.**REC.** *Caustrum* nudum, planum, scabrum.**OSS.** *Tragopogonis Vaill. Semina recta, Calyx corolla longior.**Tragopogonoïdes Vaill. Semina incurvata, Calyx corolla brevior.*811. SCORZONERA.* *Tournef. 269. Vaill. A.**G. 1721. 53. 13. 16 14. Scorzoneroides Vaill.**A.G. 1721. figuris iisdem.***CAL.** *Communis* imbricatus, longus, subcylindraceus: *squamis* circiter quindecim**COR.** *Composita* imbricata, uniformis: *corollulis* hermafroditis plurimis, *exterioribus* paulo longioribus.*Propria* monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinque-dentata.**STAM.** *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata.**PIST.** *Germen* infra corollam propriam. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.**PER.** nullum. *Calyx* ovato-oblongus, connivens.**SEM.** solitaria, oblonga, cylindracea, striata, calyce dimidio breviora, coronata *Pappo* plumoso.**REC.** nudum.**OSS.** *Scorzonera V. foliis integris gaudet.**Scorzoneroides V. foliis divisis & laciniatis est.*