

Tiges-épaisses-brunes-subsillonnées-vergetées, feuillées dans le $\frac{1}{3}$ inférieur, 1-2-céphales; feuilles oblongues-lancéolées-longuement acuminées, ondulées-erodées sur les bords épaissis; pétiole-ailé-engainant; les caulinaires moyennes sessiles-étroites-oblongues; pédicule-mono-bractéolé-long-robuste, épaissi sous la calathide, pouvant atteindre 5 cent. de haut à l'anthèse, cylindrique, un peu atténuée sur le pédoncule; bractées extérieures du péri-cline 3-4, courtes-acuminées-étalées, très larges, 9-10 mill., les intérieures finement veinées de brun, encore plus larges et très longues, dépassant la laine roussâtre des aigrettes, lanugineuses sur les bords, la page intérieure et même à l'extérieur des pointes les plus allongées; ligules profondément sillonnées-anguleuses-dépassant longuement les aigrettes, mesurant environ 2 cent. sur la fin de l'anthèse.

Hab.—Logroño: Fonca, marges herbeuses.

Leg. Hno. Elías.

N.^o 5000. *Scorzonera affinis* Senn. et El.; st. **humilis**.

Caules longi; internodii longi, pauci; folia radicalia externa brevia, sequentia longissima, fere 20 cent.; pedunculi minute bracteolati, periclinium cylindricum, 3-3 $\frac{1}{2}$ cent. ad finem antheseos, flavescens.

Tiges longues subépaisses-paucifoliées?striées-sub-anguleuses-sillonnées, aranéeuses jusqu'à la base des calathides; entrenœuds longs, peu nombreux; feuilles radicales extérieures courtes, largement engainantes, les suivantes très longues, 20 cent. environ, étroites-ner-vées-aiguës; les caulinaires-sessiles-étroites-rares; pédon-cules finement bractéolés, épaissis sous le réceptacle; pé-ricline cylindrique assez long, 3-3 $\frac{1}{2}$ cent. à la fin de l'anthèse, flavescens; bractées extérieures lancéolées-aiguës, lanugineuses à la base; les intérieures longue-ment linéaires, luisantes, à bords scarieux.

Hab.—Burgos: Regumiel, Quintanar de la Sierra, prairies humides, vers 1100 m.

Leg. Hnos. Claudio et Elías.

N.º 4.442 **Picris Rieli** Senn.; st. **hieracicoides**.

Planta ramosissima, valde hispida; pedunculi fistulosi, claviformes; bracteæ externæ periclinii reflexæ, internæ applicatæ, acutæ; styli fusci; achænia læte fusca rubescentia, transverse striolata.

Plante très rameuse, très hispide sur les tiges, les rameaux et les feuilles, celles-ci sessiles-oblongues acuminées-déjetées, largement laciniées-ondulées sur les bords; pédoncules fistuleux-claviformes-pauci-bractéolés-pubérulents, courtement hispidulés; bractées extérieures du péricline réfléchies; les intérieures appliquées-aiguës faiblement scarieuses aux bords, atteignant le sommet des aigrettes blanches légèrement subrubescentes; pointes extrêmes noires-rubescents dans les ligules; styles bruns; akènes d'un beau brun rubescent, finement et admirablement striulés-sinués en travers.

Hab.—Cerdagne, où il abonde par les marges herbeuses: Llivia, Saréja, Estavar, Angoustrine, Villeneuve, Llo, Osséja...

Note.—Dédicace d'affectueuse estime à M. le Dr. Philibert Riel, Président de la Société Linnéenne de Lyon.

N.º 4.997 **Leontodon Molineri** Senn. et El.

Scapus crassus; folia omnia radicalia, anguste lanceolata; periclinium fuscens; bracteæ anguste lanceolatae, applicatae.

Souche épaisse d'un noir rubescent; hampes moncéphales-striées-sillonnées-glabres, légèrement pubérulentes à la base, bractéolées vers le sommet faiblement