

† *Species non satis notæ.*

61. *S.?* *AFRICANA* (Poir. dict. suppl. 5. p. 114), caule suffruticoso erecto debili ramoso, foliis semiamplexicanalibus pinnatifidis denticulatis crassis glabris, paniculâ diffusâ pedunculis subumbellatis. ζ in Africâ orientali propè Mozambicum. Scorz. pinnatifida Lour. fl. coch. ed. W. v. 2. p. 584. Invol. oblongum. Cor. dilute lateæ. Pappus plumosus.
62. *S. AMBIGUA*, foliis glabris linearibus apice callosis, radice maximâ tuberoso-bulbosâ in collum supernè attenuatâ. \mathcal{Y} in saxosis insulæ Meli (d'Urv.), et in monte Bongourlou circâ Byzantium (d'Urv.). *S. araneosa* d'Urv. enum. n. 729 excl. syn. Differt à *S. araneosâ* verâ foliis angustis glaberrimis et capitulo (teste Urvilleo in litt.) luteo, à *S. lanatâ* foliis glabris, etc. Ex foliis valde accedit ad *S. crocifoliam* Sibth. sed auctores circâ hanc loquentes silent de radice tuberosâ. (v. s. sine flor.)
63. *S. CHONDRILLOIDES* (Pouff. in Willd. sp. 3. p. 1505), caule subaphyllo ramosissimo, foliis radicalibus linearibus obtusis integris dentatis runcinatisve, pedunculis squamosis. — in Hispaniâ. Facies Chondrillæ. Pappus sessilis plumosus. Cæt. ign.
64. *S. DALMATICA* (Host fl. austr. 2. p. 391), caule striato hirsuto supernè aphyllò, foliis linearibus glabris, invol. squamis membranaceis hirsutis cuspidatis. \mathcal{Y} in Dalmatiæ insulâ Lissâ. Cæt. ign.
65. *S. GRAMINIFOLIA* (Linn. sp. 1112), foliis lineari-ensiformibus integris carinatis. — in Lusitaniâ, Sibirîâ. Species omninò obscura. Var. Lusitanica est fortè *S. macrocephala* nostra. Var. Sibirica videtur *S. parviflora*. Syn. Buxbaumii (cent. 2. t. 21) non malè *S. angustifoliam* refert. †.
66. *S. HISPIDA* (Forsk. fl. æg.-ar. p. 215), pilis albis rigidis furcatis hispida, caule erecto subfolioso 1-3-cephalo, foliis runcinatis, pedunculis sub pedunculo incrassatis, achæniis linearibus. — in Galatiâ. Pappus substipitatus plumosus. An eadem ac *Asterothrix asperima*?
67. *S. LANUGINOSA* (Baumg. fl. trans. 3. p. 9), molliter et densè lanata, caule erecto angulato striato supernè ramoso, foliis corymbosis, invol. squamis ovato-lanceolatis. \mathcal{Y} in aridis montosis Transylvaniæ juxtâ Bonyha. Cor. sulphureo-luteæ. Achæn. indescr.

† † *Species exclusæ.*

- S. ACAULIS* Willd. = *Taraxacum palustre* δ .
- S. ASPERA* Desf. = *Hymenonema asperum*.
- S. ASPERRIMA* Willd. = *Asterothrix asperima*.
- S. AUTUMNALIS* Linn. = *Oporinia autumnalis*.
- S. CALCITRAPIFOLIA* Vahl. = *Podospermum calcitrapifolium*.
- S. CALLOSA* Mor. = *Podospermum callosum*.
- S. CAPENSIS* Thunb. = *Lactuca Capensis* β .
- S. CILIATA* Forsk. = *Picridium Tingitanum*.
- S. COLUMNÆ* Guss. = *Podospermum Columnæ*.
- S. CREPIOIDES* Poir. = *Sonchus crepioides*.
- S. DICHOTOMA* Vahl. = *Microhynchus nudicaulis* β .
- S. ELONGATA* Willd. = *Hymenonema Græcum*.
- S. GLANDULOSA* Pouff. = *Zollikoferia pumila*.
- S. GRÆCA* Linn. = *Hymenonema Græcum*.
- S. HISPIDA* Bieb. = *Asterothrix asperima*.
- S. HISPIDULA* Spreng. = *Oporinia hispidula*.
- S. LACINIATA* Bieb. = *Podospermum canum*.
- S. LACINIATA* Linn. = *Podospermum laciniatum*.