

45. *S. VILLOSA* (Scop. carn. ed. 2. n. 952. t. 46. mal. non Bieb.), tota pilis sparsis villosa, caule erecto subramoso striato, foliis linearibus carinatis erectis integerrimis, invol. circ. biserialis squamis acuminatissimis, achæniis muricato-tuberculatis. \mathcal{L} in agro Tergestino (Scop. Moric.). *Galasia villosa* Cass. dict. p. 286. Cor. flavæ, exterior. capituli subtus rubentes. (v. s.)
46. *S. ANCYRITANA*, tota villis confertis lanuginoso-villosa, caule erecto tereti, foliis lanceolatis multinerviis, inferioribus utrinque attenuatis, super. basi obtusis subsemiamplexicaulibus, invol. squamis biserialis acuminatis, exter. villosis, inter. glabris, achæniis lævibus. — in Anatoliâ propè Ancyram nunc Angora seu Angoury (Liston!) et in Armeniâ (Auch. l. n. 3344). Radix tuberosa. Cor. ex sicco vid. pallidè flavæ. Achænia glabra angulato-prismatica. Pappus multisetosus rigidus scaber. Stirps speciosissima à clarâ dominâ Liston cum cl. Parolini comm. (v. s. comm. à cl. Aucher.)

Sect. III. LASIOSPORA *Less. syn.* 134. — *Lasiospora Cass. dict.* 25. p. 306. — *Lasiospermum Fisch. non Lag.*

Pappi setæ plumosæ apice nudæ inæquales pluriseriales. Achænia villosissima ferè lanata.

47. *S. HIRSUTA* (Linn. mant. 278), caulibus adscendentibus 1-cephalis apice subnudis, foliis linearibus carinatis sparse pilosis, invol. squamis acuminatis glabris margine subsarciosis, \mathcal{L} in collibus aridis Occidentia, Galloprovinciæ, Pedemontii, regni Neapolitani, Siciliae. DC. fl. fr. n. 2981. *Sc. eriosperma* Gou. ill. p. 52 non Bieb. *Hieracium capillaceum* All. ped. n. 779. t. 31, f. 3 ex auctuar. p. 12. *Lasiospermum hirtum* Fisch. cat. h. gor. 1812. *S. hispida* Forsk. fl. p. 215? *Lasiospora hirsuta* Cass. dict. 25. p. 308. *Geropogon calyculatus* Linn. syst. veg. 562. Jacq. h. vind. t. 106. et *Geropogon hirsutus* All. non Linn. ex Smith in Rees cycl. v. 16. *Galasia Jacquini* Cass. dict. 25. p. 82. in notâ. Scorz. Julia Vest in florâ 1820. p. 6. ex Mœsl. et Reichb. Cor. flavæ. Invol. glabrum. Caulis et folia variant plus minus glabrata aut pilosa. (v. v. et s.)
48. *S. ERIOSPERMA* (Bieb. casp. 117. n. 28 (excl. syn.) fl. taur. et suppl. n. 1570 non Gou.), caule basi adscendente ramoso folioso, ramis floridis nudis, foliis angustè linearibus carinatis basi lanatis, invol. subvillosa aut glabro. \mathcal{L} in apricis graminosis Caucasi circâ thermas Constantimontanas (Bieb.), ad Tiflim (Stev. l. Szow. l.). *Lasiospermum angustifolium* Fisch. l. cat. h. gor. 1812. p. 34. *Lasiospora angustifolia* Cass. dict. 25. p. 306. Achænia densissimè villosa-cana. (v. s.)
49. *S. CRETICA* (Willd. sp. 3. p. 1504), caulibus adscendentibus basi ramosis, foliis linearibus planis subciliatis, invol. squamis exter. brevissimis margine pubescentibus. \mathcal{L} in Cretâ. *Lasiospora Cretica* Cass. dict. 25. p. 308. Scorz. *Cretica angustifolia* semine tomento candidissimo. Tourn. cor. 36.
50. *S. ENSIFOLIA* (Bieb. fl. taur. 2. p. 235 et suppl. p. 523), caule erecto folioso polycephalo basi lanato, foliis lineari-ensiformibus nervosis apice filiformibus subvillosis, invol. lanuginosis squamis acuminatis. \mathcal{L} in arenâ mobili deserti Caucasico-Caspici et ad Wolgam inferiorem ad Sareptam, Kirkas, etc. *Lasiospermum ensifolium* Fisch. l. cat. h. gor. 1812. p. 34. *Lasiospora ensifolia* Cass. dict. 25. p. 307. (v. s.)
51. *S. LANATA* (Bieb. fl. taur. et suppl. n. 1574), radice tuberosâ, caule 1-cephalo scapiformi parcè lanato folia duplè et ultra superante, foliis radicalibus lineari-lanceolatis undulatis sericeo-lanuginosis, invol. squamis exter. sericeo-lanuginosis. \mathcal{L} in Iberiæ collibus siccis circâ Tiflim (Bieb. Szow. l.), circâ Derbentum (Stev. l.), in Asiâ minore (Auch. l.) ad pagum Gœrluk ad ripas Euphrati (Chesn. l.), in Græciâ ad Naupliam (Zucc. l.). *Tragopogon lanatus* Willd. sp. 3. p. 1495. *Leontodon lanatus* Linn. amœn. 4. p. 287 excl. Rauw. syn. ex Smith. *Lasiospora lanata* Fisch. l. et Mey. l. pl. Szow. ined. *Troximon lanatus* Pers. ench. 2. p. 360. — Clus. hist. 2. p. 245. Cor. flavæ invol. paulò longiores. (v. s.)
52. *S. LATIFOLIA*, canescenti-tomentosa, caule erecto folioso polycephalo, foliis