

involucris squamis interioribus glabris. \mathcal{L} in pascuis humidis Galliae occidentalis, mediae, orientalisque. — Fl. fr. 4. p. 55. L. danubiale Jacq. aust. t. r64. — All. ped. t. 70. f. 3. Vill. dauph. 3. t. 24. (v. v.)

β . *arenarium*, foliis lineari-lanceolatis indivisis subdentatis. — In sabuletis maritimis agri Syrtici propè Teste de Buch reperiit cl. L. Dufour. (v. s.)

5. L. HISPIDUM (L. sp. 1124.) radice præmorsâ, foliis pinnatifido-oblongis laciniis nervo medio perpendicularibus hispidis pilis bifurcatis, scapo unifloro subglabro, involucris squamis lanceolatis acutis subhirsutis. \mathcal{L} in lapidosis apricis. — Fl. fr. 4. p. 55. excl. var. β et γ . 5. p. 453. (v. v.)
6. L. CRISPUM (Vill. dauph. 3. p. 84. t. 25.) radice simplici verticali, foliis runcinato-pinnatifidis laciniis lineari-lanceolatis nervo medio inclinatis hispidis pilis apice ramosis, scapo 1-floro hirto, involucris squamis lanceolatis acutis basi sublanatis. \mathcal{L} in siccis Delph., Occitaniae, Pyren. ex Lapeyr., Bellovacii ex cl. Graves. — Fl. fr. 5. p. 454. (v. v.)
7. L. VILLARSII (Lois. gall. 514.) radice subsimplici verticali, foliis pinnatifidis laciniis lineari-lanceolatis nervo medio perpendicularibus hispidis, pilis simplicibus, scapo 1-floro, involucris squamis hispidulis glabrisve, interioribus lanceolatis acuminatis. \mathcal{L} in siccis apricis Delph. infer., Galloprov., Occitaniae, agri Ruscinonensis. — Fl. fr. 5. p. 454. L. hirtum Vill. dauph. 3. p. 82. t. 25. (v. v.)
8. L. AUTUMNALE (L. sp. 1123.) foliis lanceolatis pinnatifidis glabris, scapis ramosis declinatis squamosis, pedunculis sub involucrio tumescentibus, involucris squamis puberulis lanceolatis acuminatis. \mathcal{L} ad margines agrorum et viarum. — Fl. fr. 4. p. 53. — Fuchs. hist. 320. ic. (v. v.)
 β . *simplex*, caule 1-floro. — eng. bot. t. 830. (v. v.)

LXXXVIII. PODOSPERMUM DC. fl. fr. 4. p. 61. — Scorzonerae sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; semina pedicellata pedicello cavo incrassato; receptaculum seminibus delapsis tuberculato-muricatum; pappus sessilis plumosus.

1. P. CALCITRAPÆFOLIUM (DC. fl. fr. 5. p. 455.) caule basi ramoso, foliis petiolatis pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis, terminali longiore lanceolatâ, superioribus simplicibus, seminibus angulatis glaberrimis. \mathcal{L} in provinciis australibus et circâ Parisios. — P. resedifolium Fl. fr. 4. p. 61. non L. — Barr. ic. 800. (v. v.)
2. P. LACINIATUM (DC. fl. fr. 4. p. 62.) caule ramoso erecto, foliis petiolatis pinnatifidis laciniis linearibus acuminatis, terminali longissimâ lineari-lanceolatâ, superioribus linearibus, seminibus subangulatis glaberrimis. ② ad marginem agrorum. — Scorzonera laciniata L. Gærtn. fr. 2. t. 159. f. 1. S. petiolaris Lapeyr. abr. supp. 120. (v. v.)
3. P? SUBULATUM (DC. fl. fr. 4. p. 61.) caule subramoso infrâ folioso supernè nudo, foliis rigidis linearibus carinato-subulatis. \mathcal{L} Sorricinii. — An Scorzonerae pinifoliae Gou. ill. 53. var? (v. s. in specim. imperfecto.)

LXXXIX. SCORZONERA DC. fl. fr. 4. p. 59. — Scorzonerae sp. L.

Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis; receptaculum nudum; semina sessilia; pappus substipitatus plumosus.

1. S. HIRUTA (L. mant. 278.) caule 1-floro, foliis linearibus subhirsutis obtusis, involucris squamis lanceolatis acuminatis glabris, seminibus lanatis. \mathcal{L} in lapidosis sterilibus Occitaniae, Galloprovinciae circâ Massiliam et montem Victoriae, Rupellam. — Fl. fr. 4. p. 60. — Hieracium capillaceum All. ped. t. 31. f. 3. (v. v. DC.)
2. S. ANGUSTIFOLIA (L. sp. 1113.) caule subnudo unifloro apice tomentoso, foliis sublinearibus basi lanatis, involucris squamis subglabris subobtusis, exterioribus lanceolato-ovatis, interioribus lineari-oblongis. \mathcal{L} in Galliâ mediâ, australi occidentalique. — Fl. fr. 4. p. 60. Gm. sib. 2. p. 2. t. 1. (v. v.)

β. *Provincialis*, caule foliisque glabris. — In paludosis salsis Galloprovinciæ.
(v. s.)

3. *S. ARISTATA* (Ram. in DC. fl. fr. 4. p. 922.) caule subnudo 1-floro, foliis linearibus acuminatis longissimis glabris, involucri squamis inferioribus foliaceis laxis subulatis florem æquantibus, interioribus obtusis, seminibus tuberculosus. ♀ in herbosis Pyren. editiorum. — *S. grandiflora* Lapeyr. (v. v. DC.)
4. *S. HUMILIS* (L. sp. 1112.) caule subnudo subunifloro, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis 5-7-nerviis acuminatis, superioribus linearibus, involucri squamis exterioribus ovatis subacutis, interioribus lanceolatis obtusis. ♀ in pratis rariis. — Fl. fr. 4. p. 59. — Clus. hist. 2. p. 138. f. 2. (v. v.)
5. *S. HISPANICA* (L. sp. 1112.) caule ramoso 5-6-floro, foliis amplexicaulibus integris basi denticulatis. ♀ in oleraceis hortis culta. — Fl. fr. 4. p. 59. — Blak. t. 406. (v. v.)
6. *S. PARVIFLORA* (Murr. syst. veg. ed. 14. p. 710.) caule ascendente folioso basi ramoso, foliis lanceolato-ensiformibus glabris amplexicaulibus acuminatis nervosis, involucri glabri squamis obtusis, exterioribus ovatis interioribus lanceolatis. ♀ in littoribus Mediterraneis ex cl. Benth. — Jacq. aust. 4. t. 305. (v. s. ex Hung.)
7. *S. GRAMINIFOLIA* (L. sp. 1112.) caule folioso sub-1-floro apice tomentoso, foliis lineari-ensiformibus amplexicaulibus acutissimis nervosis, involucri subvillosi squamis exterioribus acuminatis, interioribus lanceolatis acutis. ♀ in Galliâ australi. — Jacq. obs. 4. p. 13. t. 100. sed in nostrâ capitulum foliis non stipatum. (v. s.)
8. *S. PURPUREA* (L. sp. 1113.) caule stricto 1-2-floro basi lanato, foliis lineari-subulatis canaliculato-triquetris basi pubescentibus, involucri squamis obtusis exterioribus ovato-oblongis lanuginosis, interioribus sublinearibus. ♀ in pratis umbrosis circâ Mimatem reperiit cl. Prost. — Jacq. aust. t. 35. — Gmel. sib. 2. t. 2. Fl. purpurei. (v. s.)

Xc. *HYOSERIS* Lam. dict. 3. p. 158.

Involucrum calyculatum; receptaculum nudum; seminum centralium pappus pilosus inæqualis, radii squamatus subabortivus.

1. *H. RADIATA* (L. sp. 1137.) foliis glabris runcinato-pinnatifidis laciniis dentato-angulatis reflexis, terminali 3-dentatâ, scapis unifloris nudis, involucri squamis exterioribus minimis lanceolatis. ♀ in collibus maritimis Galliæ australis. — Fl. fr. 4. p. 49. — Pluck. t. 37. f. 2. (v. v.)
2. *H. SCABRA* (L. sp. 1138.) foliis lyrato-pinnatifidis dentatis scabriusculis, laciniis inflexis, scapis unifloris nudis apice incrassatis, involucreo exteriori subnullo. (I) in olivetis circâ Nicæam. — Fl. fr. 4. p. 49. — Bocc. mus. 2. t. 106. (v. s.)
3. *H. HEDYCFNOIS* (L. sp. 1138.) caule tereti ramoso, foliis inferioribus oblongis sinuato-dentatis basi attenuatis, superioribus subamplexicaulibus lanceolatis, involucri fructigeris glabris. (I) inter segetes et in sterilibus Delph. et provinc. mediterranearum. — Fl. fr. 4. p. 50. — Lob. ic. t. 239. f. 1. (v. v.)
β. *nana*, caule nano 1-floro. (v. s.)
γ. *rhagadioloides* (DC. mss.) involucri hirtellis. — *H. rhagadioloides* L. sp. 1139. Fl. fr. 4. p. 50. (v. s.)
4. *H. CRETICA* (L. sp. 1139.) caule ramoso, foliis radicalibus sinuato-dentatis apice subretusis, caulinis subdentatis oblongis subcordatis amplexicaulibus, pedunculis tumidis apice fistulosis, involucri hirtis. (I) in arvis circâ Nicæam. — Fl. fr. 4. p. 51. Gærtn. fruct. 2. t. 160. f. 2. (v. s.)

Xci. *CATANANCHE* Tourn. t. 271. L. gen. 920.

Involucrum imbricatum scariosum; receptaculum paleaceum; pappus sessilis 5-squamosus squamis mucronatis.