

canaliculatis, pedunculis incrassatis, achæniis 8-9 lineas longis etc. differt. *S. crocifolia* Sibth. foliis patulis rigidis latissimè nervosis, caulinibus simplicibus, achæniis muriculatis valdè diversa. *S. elata* habitu quoque ad *S. macrospermam* Turcz. cæterùm diversissimam accedit. Legi in collibus Lydiæ et Cariæ plantam meæ speciei quoad capitula et fructus simillimam sed humiliorem et pedalem aut sesquipedalem et foliis angustissimiis vix lineam latis distinctam. Hanc meæ speciei ut varietatem *angustifolium* adjicio.

SCORZONERA ARGYREA Boiss. (Sect. *Euscorzonera* DC.)

Sc. tota lanâ densissimâ adpressâ sericeo-argenteâ obtecta, radice tuberosâ, caulinis pumilis inclinatis foliosis simplicibus aut ramulo laterali auctis, foliis radicalibus ovato-oblongis in petiolum brevem attenuatis acutiusculis, caulinis sessilibus breviter ovatis acutis, capitulis e foliis breviter exsertis terminalibus solitariis, involueri lanâ longâ obtecti phyllis lanceolatis acutis exterioribus plus dimidiò brevioribus, flosculis involucrum non superantibus, achæniis glaberrimis obsoletè tuberculatis pappo rufescenti multiseto eis paulò longiori terminatis, setis omnibus a basi ad apicem plumosis.

Hab. in *Cariâ* undè duo tantùm specimina attulit Chr. Pinard.

Caules 4-5 pollicares inclinati, folia inferiòra 2 $\frac{1}{2}$ pollices longa ferè 10 lineas lata, caulina ferè 9-10 lineas longa 6-7 lata, capitula magnitudinis eorum *S. eriophoræ* DC. Indumentum densissimum adpressum niveum nitidum.

PICRIS OLYMPICA Boiss. (Sect. *Eupicris* DC.)

P. perennis tota pilis apice breviter glochidiatâ aspera, foliis omnibus radicalibus lanceolatis runeinatis dentibus triangulari-lanceolatis acutis, caulinis glabrescentibus pumilis procumbentibus ascendentibusve tortuoso-ineurvis ramosis nudis aut ad dichotomias folio parvo lanceolato-lineari suffultis, pedunculis longis subincrassatis parcè squamulosis apice nigricanti-tomentellis exterioribus dimidiò brevioribus, involueri subbiserialis squamis adpressis lanceolatis nigricantibus medio farinaceo-tomentellis, ligulis subtùs purpurascensibus, achæniis