

*Similis praecedenti sed folia radicalia latiora, laciniae lanceolatae decurrentes et calyces canescentes ante anthesin octangulares. Gouani planta huc pertinere videtur, licet descriptio praecipue respectu caulis, qui in nostra erectus, discrepet. W.*

\***26. SCORZONERA pumila.**

S. foliis pinnatifidis acutis glabris, scapo squamoso glabro unifloro. W.

S. acaulis, foliis pinnatis, pinnulis linearibus glabris apicibus albis. *Cavan. ic. 2. p. 19. t. 121. f. 2.* \*

Kleine Haberwurz. W.

*Habitat in Hispania.* ○

*Folia pinnatifida glabra, laciniis linearibus acutis apice calloso-mucronatis. Scapus uniflorus squamis lanceolatis sparsis tectus. W.*

\***27. SCORZONERA coronopifolia.**

S. foliis pinnatifidis dentatis obtusis pubescentibus, scapo subaphyllo nudo tomentoso unifloro. W.

S. (*coronopifolia*) foliis pinnatifido-laciniatis pubescentibus, caule subnudo simplici unifloro. *Desf. atl. 2. p. 220. t. 212.* \*

S. (*brevicaulis*) foliis integris pinnatifidisque, caule tomentoso subaphyllo. *Vahl. symb. 2. p. 88. t. 44.* \*

Kurzstielige Haberwurz. W.

*Habitat in montibus Barbariae.* 24

**28. SCORZONERA orientalis.**

S. foliis sinuatis denticulatis acutis, caulis subunifloris. *Sp. pl. 1113.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 17.*

Orientalische Haberwurz. W.

*Habitat in Oriente.* Hasselquist.

*Folia profunde dentata, fere Leontodontis, margine denticulata, glabra. Caules breves, foliosi, subuniflori. Calyx squamis imbricatis: inferioribus, imprimis lateribus, margine late membranaceis: Corolla lutea, magnitudine S. humilis.*

\***29. SCORZONERA asperrima.** W.

S. foliis runcinatis hispidis, caule subbisfloro subfolioso hispido. W.

*Lin. Sp. Pl. Tom. III. P. III.*



Scharfblättrige Haberwurz. W.

*Habitat in Galatia. (v. f.)*

Folia *Apargiae hispidae* pilis crassis albis rigidis furcatis dense tecta. Caulis erectus uni-vel biflorus rarissime triflorus, pilis ejusdem formae tectus, et foliis binis vel tribus obsitus. Pedunculi sub flore incrassati. Semina longa linearia. Pappus substipitatus plumosus. W.

\* 30. SCORZONERA *taraxacifolia*.

S. foliis runcinatis obtuisis glabris, scapo aphylllo ramoso, pedunculis incrassatis. W.

S. (*taraxacifolia*) foliis runcinatis in petiolum decurrentibus, scapo ramoso aphylllo. *Jacq. ic. rar. 1. t. 106. Collect. 1. p. 52.*\*

Löwenzahnblättrige Haberwurz. W.

*Habitat in Bohemia. 24 (v. v.)*

*Habitus Hypochoeridis radicatae, sed folia glabra et fructificatio Scorzonerae.* W.

\* 31. SCORZONERA *acaulis*. W.

S. foliis runcinatis glabris, scapo nudo unifloro. W.

S. (*Taraxaci*) scapo nudo unifloro, foliis lanceolatis runcinato-dentatis acuminatis. *Roth. Beitr. 1. p. 120. \* Ejusd. catal. 1. p. 95.*

Stiellose Haberwurz. W.

*Habitat in Silesia. ♂ (v. f.)*

*Habitus Taraxaci.* W.

32. SCORZONERA *elongata*. W.

S. foliis subtus tomentosis, radicalibus lyratis, caulinis pinnatis, caulibus subramosis foliosis. W.

Catananche (*graeaca*) foliis incisis. *Sp. pl. 1142.*

Catananche lutea foliis varie incisis. *Vaill. act. 1721. p. 216.*

S. *graeaca* saxatilis et maritima foliis varie laciniatis. *Tou nef. cor. 36 itin. 1. p. 223. t. 223.*

Langstielle Haberwurz. W.

*Habitat in Graciae maritimis rupestribus. (v. f.)*

Folia radicalia lyrata subtus incano-tomentosa, caulinis pinnatifida subtus incana tomentosa, laciniis lanceolatis acutis. Caules plures erecti: foliosi simplifices vel ramosi. Pedunculi elongati. Calyx oblongus