

1402. SCORZONERA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1230.

Receptaculum nudum. Pappus plumosus substitutus. Calyx imbricatus squamis marginie scariosis.

1. SCORZONERA *tomentosa*.

S. foliis ovatis nervosis tomentosis integerrimis sessiliibus. *Sp. pl. 1112. Pall. it. 3. p. 682.*

S. orientalis latifolia nervosa candidissima et tomentosa. *Tournef. cor. 36.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 10.

Filzige Haberwurz. W.

Habitat in Armenia. 24 (v. f.)

Caulis *rectus, simplex, tomentosus. Folia alterna, sessilia, vix semiamplexicaulia, acutiuscula. Rami floriferi, axillares, solitarii, uniflori s. biflori, vix folio longiores: Bracteae una alterave lanceolata.*

Folia *radicalia lanceolato-ovata acuta petiolata utrinque pube tenui ut tota planta tecta. Caulis fere pedatis. Folia caulinæ alterna sessilia amplexicaulia ovato-acuminata integerrima nervosa. Flores terminales plures breve pedunculati, et in axillis superioribus foliorum, pedunculis folio multo brevioribus. Semina cylindracea striata. Pappus sessilis capillaris scaber. Caulis et Folia fere ut in Gentiana asclepiadea*

*2. SCORZONERA *austriaca*. W.

S. caule subnudo unifloro calycinisque squamis glabris, foliis linear-lanceolatis. W.

Scorzonera humilis. Jacq. austr. t. 36. Host. synop. 420.

S. caule nudo unifloro, foliis lanceolatis. Hall. helv. n. 10.

S. lusitanica graminifolia. Buxb. cent. 2. p. 26. t. 21?

S. humilis angustifolia pannonica. Clus. hist. 2. p. 139.

Oestreichische Haberwurz. W.

Habitat in collibus et pratis apricis Austriae, Helvetiae.

24 (v. f.)

Differet a sequenti: caule semper unifloro glaberrimo, squamis calycinis acuminatis, margine membranaceis glabris, foliis linear-lanceolatis. W.