

шие, треугольно-ланцетные или ланцетные, островатые, б. м. отогнутые вниз; внутренние в три раза длиннее наружных, удлиненно-ланцетные или линейно-ланцетные, слегка заостренные. Незрелые семянки коричневые, около 5 мм дл., голые, гладкие. Хохолок вдвое длиннее семянки, щетинки его желтые (впоследствии рыжеющие?), почти до верхушки густо перистые.

Измерения: прикорневые листья 2.5 см дл. и 1.5 см шир.; 3.5 см дл. и 2.5 см шир.; нижние стеблевые листья 6—8 см дл. и 3.2 см шир.

Тип. Турция. «Prov. Hakkari: Cilo-Dag, in Diz deresi, 5700 ft. 6 VIII 1954, № 23925. O. Polunin». Хранится в Гербарии Эдинбургского ботанического сада.

Сходство. Этот красивейший вид очень сходен с *S. latifolia* (Fisch. et Mey.) DC и *S. veratrifolia* Fenzl, но сразу отличается от них голыми, гладкими семянками, формой листьев (прикорневые и нижние стеблевые листья лопатчато-эллиптические или обратнояйцевидные, тупые, а не ланцетные или широко ланцетные оттянуто-острые, как у *S. latifolia* и *S. veratrifolia*). От *S. cinerea* Boiss. прекрасно отличается характером соцветия (соцветие метельчатое, корзинки многочисленные), меньшими корзинками, формой листьев (прикорневые листья лопатчато-эллиптические или обратнояйцевидные, на верхушке тупые или туповатые, а не ланцетные острые, как у *S. cinerea*), семянками и хохолком меньших размеров.

Series *Sosnovskyanae* Lipsch. hoc loco [Sect. *Nervosa* Lipsch. *Fragmenta monographiae generis Scorzonera*, 1 (1935) 126]. — Pubescentia densissime argyreo-pannosa velutina, nitens. Folia lata, plurinervia, nervis arcuatis pubescentiae causa inconspicuis. Achenia lanata vel glabra. Pappus dense plumosus.

Typus seriei. *Scorzonera Sosnovskyi* Lipsch.

Опушение густо серебристо-шерстистое, бархатистое, блестящее. Листья широкие, со многими жилками, жилки дугообразные, скрыты опушением и потому неясные. Семянки шерстистые или голые. Хохолок густоперистый.

Тип ряда. *Scorzonera Sosnovskyi* Lipsch.

К этому ряду относятся также виды: *S. Ketzkhovelii* Sosn., *S. Wronowii* Krasch., *S. tomentosa* L.,? *S. veratrifolia* Fenzl.

Scorzonera bella Lipsch. sp. nova. — Tota planta densissime argyreo-pannosa, velutina, nitens. Perennis, verisimiliter rhizomate crasso verticali cylindrico. Caulis crassus, elatus, ca. 75 cm lg., usque ad inflorescentiam foliosus, ramosus. Folia plurinervia, nervis arcuatis pubescentiae causa inconspicuis, marginibus plana; radicalia et caulina inferiora elliptica, apice obtusata, basi in petiolum canaliculatum longum laminae aequilongum attenuata; media sessilia, subamplexicaulia, late lanceolata vel elliptica, sursum sensim deminuentia; summa minora acutiuscula. Calathidia obconica ca. 1.2 cm lg., numerosa, in inflorescentiam generalem laxam paniculatam disposita;

ramis ca. 4 cm lg., pedunculis brevioribus velutinis; foliis supremis inflorescentiae approximatis. Flores vitellini, involucro vix longiores. Involucrum velutinum; phyllaria exteriora minima, interiora exterioribus triplo longiora, elongato-lanceolata vel linearis-lanceolata, subacuminulata, acumine brevi. Achenia immatura ca. 5 mm lg., lanata. Pappus achenio aequilongus, setis flavis (an demum rufescens?), fere ad apicem dense plumosis.

Т ур п. «Turkey. Prov. Hakkari: Cilo-Dag, in Diz deresi, 5700 ft. 6 VIII 1954, № 23926. O. Polunin». In Herbario Horti Botanici Edinburghensis conservatur.

A f f i n i t a s. Affinis *S. Sosnovskyi* Lipsch. sed calathidiis minoribus numerosisque in paniculam dispositis, phyllariis pedunculisque velutinis et pappi dimensionibus sat differt.

Все растение густо серебристо-шерстистое, бархатистое, блестящее. Многолетник, вероятно с толстым, вертикальным; цилиндрическим корневищем. Стебель толстый, высокий, около 75 см дл., олиственый до соцветия, ветвистый. Листья со многими жилками, жилки дугообразные, скрытые опушением и поэтому неясные; пластинка по краю плоская; прикорневые и нижние стеблевые листья эллиптические, на верхушке притупленные, в основании оттянутые в длинный желобчатый черешок, равный длине пластинки; средние сидячие, слегка стеблеобъемлющие, широко ланцетные или эллиптические, постепенно вверх по стеблю уменьшающиеся; самые верхние листья наименьшие, островатые. Корзинки обратноконические, около 1.2 см дл., многочисленные, собранные в общее метельчатое рыхлое соцветие; ветви около 4 см дл.; ножки корзинок более короткие, бархатистые; самые верхние листья приближенные к соцветию. Цветки желточно-желтые, слегка длиннее обертки. Обертка бархатистая; наружные листочки ее наименьшие; внутренние в три раза длиннее наружных, удлиненно-ланцетные или линейно-ланцетные, с коротким остроконечием, острие короткое. Незрелые семянки около 5 мм дл., шерстистые. Хохолок равный семянке; щетинки его желтые (впоследствии рыжеющие?), почти до верхушки густоперистые.

Т и п. Турция. «Prov. Hakkari: Cilo-Dag, in Diz deresi, 5700 ft. 6 VIII 1954, № 23926. O. Polunin». Хранится в Гербарии Эдинбургского ботанического сада.

С х о д с т в о. Сходен с *S. Sosnovskyi* Lipsch., но достаточно отличается от нее меньшими корзинками, более многочисленными, собранными в метельчатое соцветие, листочками обертки и ножками корзинок, бархатисто опущенными, а также размерами хохолка.

***Scorzonera Davisii* Lipsch. sp. nova.** — Radix ignota ut videtur non tuberosa sed cylindrica vel fusiformis. Caulis elatus 60—70 cm alt., parce pubescens, demum glaber, vix geniculatus, striatus, foliosus, superne ramosus, ramis axillaribus 5—10 (13) cm lg., terminalibus usque 20—30 cm lg. apice vix incrassatis. Folia rigida longis-