

на верхушке остроконечные и здесь с небольшой бородкой волосков; внутренние удлинённые, эллиптическо-ланцетные, около 3 см дл., на верхушке с остроконечием. Цветки желтые, превышающие обертку. Семянки белые, около 18—20 мм дл., голые, к основанию слегка изогнутые, тупо ребристые, ребра украшенные тупыми зубчиками, отчего слегка мягко-колючие. Хохолок белоснежный, около 1.5 см дл., короче сеянки; щетинки его густоперистые, 5 внутренних щетинок более длинные, в нижней части перистые, в верхней голые, шероховатые.

Т и п. Турция. «Prov. Hakkari: Zab gorge 30 miles S. of Baskale, 3 VIII 1954. Davis, № 23 848. O. Polunin». Хранится в Гербарии Эдинбургского ботанического сада.

С х о д с т в о. Близка к *S. elata* Boiss., но с первого взгляда отличается от нее мощным ростом, слегка коленчатым стеблем, прикорневыми и некоторыми стеблевыми листьями по краю неясно зубчатыми, более крупными корзинками, сеянками вдвое длиннее, по ребрам украшенными зубчиками, отчего они мягкоигольчатые, и, по-видимому, многочисленными стеблями, а также корнем без клубня.

*Scorzonera Boissieri* Lipsch. sp. nova. — Tota plantula lana densissima adpressa sericeo-argentea oblecta. Perennis. Radix verticalis collo reliquiis induratis petiolorum vaginarumque vetustarum oblecto. Caules pumili ca. 3—4 cm lg., foliosi, monocephali. Folia ovata, ovato-oblonga vel elliptica apice vix acuminata; radicalia in petiolum latum brevem attenuata, nervis pubescentiae causa inconspicuis aut 5—7 prominulis; lamina 3—4 cm lg., 1.3—3 cm lt., petiolo 0.5—2.5 cm lg.; caulina minora 2—3.5 cm lg., 4—7 mm lt. sessilia semiamplexicaulia. Calathidium solitarium breviter pedunculatum e foliis vix exsertum; floriferum ca. 2.5—3 cm lg. (ligulis includentibus), 5—6 mm lt.; involucrium dense pubescens demum ex parte glabrescens; phyllaria pauca lanceolato-elliptica obtusata margine angustissime membranacea, externa internis duplo vel tertio parte breviora. Ligulae e nota collectoris flavidae in sicco ± expallescentes, atropurpureo-striatae, involucrium dimidio superantes. Achenia immatura brevia glabra ad quinque costas transverse tuberculata. Pappus rufescens e multis setis inaequalibus constans, achenio valde longior, setis omnibus a basi ad medium plumosis superne scabris.

Т у р у с. «Turkey. Prov. Adana distr. Saimbeyli: Bozoglan dag above Obruk yayla, 2300 m. Scree only a few plants flowering, 7 VIII 1952, Davis № 19751, Dodds, Cetik». In Herbario Horti Botanici Edinburgensis conservatur.

А ф ф и н и т а с. *S. Boissieri* ut videtur juxta *S. argyream* Boiss. [Diagnoses plantarum orientalium novarum, 1, 4 (1844) 26] e descriptione tantum mihi notam collocanda est, sed ab ea differt: collo reliquiis induratis petiolorum vaginarumque oblecto, caule breviorе,

dimensionibus foliorum radicalium, ligulis involucri longioribus, acheniis pappo valde brevioribus et omnibus pappi setis saltem ad medium plumosis superne scabris (nec a basi ad apicem plumosis ut cl. Boissier in diagnosi *S. argyreae* scripsit).

Все растение покрыто густой прижатой шелковисто-серебристой шерстью. Многолетник. Корень вертикальный, с шейкой, одетой затвердевшими остатками черешков и старых влагалищ. Стебли карликовые, около 3—4 см дл., олиственные, однокорзинчатые. Листья яйцевидные, яйцевидно-продолговатые или эллиптические, на верхушке слегка заостренные; прикорневые оттянутые в короткий широкий черешок; жилкование листа из-за опушения незаметное или 5—7 жилок слегка выступают; пластинка 3—4 см дл., 1.3—3 см шир., с черешком 0.5—2.5 см дл.; стеблевые листья меньшие 2—3.5 см дл., 4—7 мм шир., сидячие, слегка стеблеобъемлющие. Корзинка одиночная, на коротком цветоносе, слегка выдающаяся из листьев, при цветках около 2.5—3 см дл. (включая язычковые цветки), 5—6 мм шир.; обертка густо опушенная, затем частично оголяющаяся, листочки обертки малочисленные, ланцетно-эллиптические, притупленные, по краю очень узко пленчатые; наружные вдвое или на одну треть короче внутренних. Язычки, по заметке коллектора, желтые, в сухом виде бледнеющие, с темно-пурпурными полосками, на половину превышающие обертку. Незрелые семянки короткие, голые, по пяти ребрам поперечно-бугорчатые. Хохолок рыжеватый, из многочисленных неравных щетинок, значительно длиннее семянки; все щетинки от основания до середины перистые, в верхней части шероховатые.

Т и п. Турция. «Prov. Adana distr. Saimbeyli: Bozoglan dag above Obruk yaula, 2300 m. Scree only a few plants flowering, 7 VII 1952, Davis № 19751, Dodds, Cetik». Хранится в Гербарии Эдинбургского ботанического сада.

С х о д с т в о. По-видимому, *S. Boissieri* в системе рода помещается близ *S. argyrea* Boiss. [Diagnoses plantarum orientalium novarum 1, 4 (1844) 26], вида, известного мне лишь по описанию; от последнего отличается: корневой шейкой, одетой затвердевшими остатками черешков и влагалищ, укороченным стеблем, размерами прикорневых листьев, язычками, длиннее обертки, сеянками, значительно короче хохолка, и всеми щетинками хохолка, только до середины перистыми, в верхней части шероховатыми (а не от основания до верхушки перистыми, как указывает Э. Буассье в диагнозе *S. argyrea*).

*Scorzonera scopariiformis* Lipsch. sp. nova. — *S. scoparia* Boiss. et Kotschy in Sched. Kotschy, 1855, № 360 (nomen nudum). — *S. Mackmeliiana* Boiss. Fl. or. 3 (1875) 773, p. p., non Diagn. plant. orient., 1, 11 (1849) 44. — Adpressissime cana. Rhizoma crassum verticiale pluriceps squamosum dense pulvinato-caespitosum. Caules breves rigidissimi vix foliati monocephali vel 1—2 calathidiis la-