

culis acuminatis.  $\mathcal{L}$  in Hispaniâ (Clns.) ubi contrâ viperarum ictus olim usitata, in Thuringiâ (Wallr.!) Blackw. herb. t. 406. Lam. ill. 647. f. 5. S. denticulata Lam. fl. fr. 2. p. 82. S. sativa Gater. fl. mont. 156. — Clns. hist. 2. p. 137. f. 1. opt. — in hortis culinariis vulgò culta ob radicem edulem. (v. v. et s.)

$\beta$ . *crispatula*, foliis ad margines crispato-dentatis.  $\mathcal{L}$  in Hispaniâ prov. Malaga in Sierra Mijar et Bonda legit cl. Edm. Boissier. (v. s. à cl. inv.)

25. S. TAURICA (Bieb. fl. taur. n. 1558 et suppl.), pubescens, caule erecto folioso polycephalo, foliis inferioribus lanceolatis integerrimis acuminatis, super. lineari-subulatis, invol. squamis acuminatis margine subtomentosis.  $\mathcal{L}$  in Tauriâ et Bessarabiâ collibus aridis. Affinis S. Hispanicæ sed pubes vagâ subtomentosa, rami præter pedunculos laterales nulli, invol. brevius, etc. Variat ex Bieb. lanugine minùs canescente circâ Borysihenem et angustifolia sub-1-cephala ad Nartsanam. (v. s.)

26. S. MACROSPERMA (Turcz. in litt. 1833), glabra, caule erecto tereti fistuloso folioso, foliis elongatis lanceolatis plurinerviis semiamplexicaulibus integerrimis, capitulis 4-5 corymbosis pedicellatis, invol. squamis exter. ovatis brevibus, inter. lanceolatis elongatis, achæniis elongatis.  $\mathcal{L}$  in Dahuriâ herbosis propè Nerczinskoi-Savod et ad flumen Schitka detexit cl. Turczaninow. Habitu media inter Hispanicam et glastifoliam. Ab omnibus differt achænio ultrâ semen longè producto et quasi rostrato styli basi persistente mucronato. An sectiô propria? (v. s. comm. à cl. inv.)

27. S. GLASTIFOLIA (Willd. sp. 3. p. 1499. Reichb. fl. exc. 1. p. 276), radice subcylindraceâ, caule ramoso, ramis apice 1-cephalis, foliis ovali-lanceolatis basi amplexicaulibus planis acutis glabris, invol. oblongi squamis glabris acuminatis, achænio juniore subpubero.  $\mathcal{L}$  in collibus Thuringiæ (Wallr.), Germaniæ, Bohemiæ, Silesiæ (Willd.), Pedemontii? (Gaud.), Galliæ australis (Benth.). S. Hispanica  $\beta$ . Wallr. fl. hal. suppl. 3. p. 94. S. edulis Mœnch meth. 548. Valdè S. Hispanicæ affinis et potiùs var.? (v. v. et s.)

$\beta$ . *asphodeloides* (Wallr. fl. hal. suppl. 3. p. 94), foliis linearibus acuminatis strictis carinatis basi vaginantibus.  $\mathcal{L}$  in Germaniâ. S. graminifolia Hoffm. fl. germ. 272. S. angustifolia Wahl. ex Wallr. An potiùs S. montanæ var.? (v. s.)

28. S. MONTANA (Mutel fl. dauph. p. 268), radice cylindraceâ supernè nudâ, caule simplici aut subramoso parcè lanuginoso, foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis subcarinatis apice acuminatis hinc indè sublanuginosis, invol. ovato-oblongi squamis 10-12 glabris lanceolatis, exter. brevioribus.  $\mathcal{L}$  in pratis montanis Delphinatûs (Mutel) et Sabaudiæ (Bonjean!). Proximè accedit ad S. glastifoliam var.  $\beta$ . sed lanugine caulis et fol. infer. differt? (v. s.)

$\beta$ . *Bætica* (Boiss. ined.), foliis et invol. squamis angustioribus.  $\mathcal{L}$  inter dumeta circâ Esteponom Hispanorum legit cl. E. Boissier. (v. s. comm. à cl. inv.)

29. S. PARVIFLORA (Jacq. austr. 4. t. 305. Ledeb. fl. alt. 4. p. 161), glabra, collo multicipiti nudo, caule adscendente folioso 1-4-cephalo, foliis lineari-lanceolatis subensiformibus integerrimis acuminatis basi attenuatis, invol. cylindrici squamis lanceolatis, int. elongatis, ext. subbracteiformibus, ligulis vix expansis invol. paulò longioribus, achæniis lævibus.  $\mathcal{L}$  in humidis sublimosis subsalsis in Hungariâ ad lacum Nœnsiedl (DC.!), in Galliæ littoribus Mediterraneis (Benth.), in Sibiæ Altaicæ (Bess.!) deserto Noryn et ad Salinas Hezkianses (Pall.), ad Tanaim (Stev.!), in deserto Songoro-Khurgisico (Ledeb.). S. caricifolia Pall. itin. 3. app. n. 131. t. Ji. ed gall. app. n. 391. t. 99. f. 1. Folia 7-8 poll. longa, 4 lin. lata. (v. v. et s.)

30. S. BUPHTHALMOIDES, glabra erecta, caule parcè ramoso folioso, foliis lato-linearibus apice callosis rigidulis integerrimis, super. basi dilatatis, invol. glabro imâ basi tomentoso, squamis acuminatis subpatulis ligulas subæquantibus.  $\mathcal{L}$  circâ Aleppum legit cl. Aucher! S. graminifolia Auch. pl. exs. n. 3533 non Linn. Species insignis ob capitula expansa nec cylindracea, Buphtalmum salicifolium foliis et habitu capituli referens. (v. s. comm. à cl. inv.)