

COMPOSITÆ. *Linn. Adans.**Fam. I. CICHORACEÆ. Juss.*TRAGOPOGON. *Linn.*

Involucrum simplici serie 8-10-phylum, connivens, æquale. Receptaculum nudum. Achenia oblonga, sæpiùs tuberculata, apice attenuata. Pappus stipitatus, valdè plomosus. Herbæ radice simplici fusiformi. Caules sæpiùs simplices. Folia integrifima, graminea. Flores solitarii, ebracteati, aurei raro purpurei.

Obs. Huic referenda *Scorzonera rosea Willd.* ob involucrum simplex æquale, et pappum stipitatum.

1. *T. gracile*, foliis angustè linearibus carinatis basi dilatatis, involucro 6-phyllo, pappo inæquali brevè stipitato, acheniis lœvibus, caule flexuoso unifloro.

Tragopogon gracile. Don in Mem. Wern. Soc. 3. p. 414.

Hab. in alpibus Nepaliæ. Wallich. 4.

*Radix fusiformis. Caules plures, graciles, erecti, flexuosi, 4-5-pollicares, uniflori, glabri, vix foliis longiores. Folia radicalia erecta, angustè linearia, obtusiuscula, nervosa, subtùs carinata, glabra, suprà canaliculata, basi lanuginosa; caulina basi latius dilatata, amplexicaulia, suprà lanuginosa. Involucrum magnitudine *Lactucæ perennis*, 6-phylum: foliolis lanceolatis, cuspidatis, glabris, æquilibus. Flosculi pauci, lineares, lutei. Achenia lœvia. Pappus inæqualis, brevè stipitatus.*

SCORZONERA. *Linn.*

Involucrum polyphylum, imbricatum, connivens. Receptaculum nudum. Achenia oblonga, lœvia. Pappus sessilis, infernè plomosus, apice simplex.

Herbæ radice fusiformi. Caules sæpiùs ramosi. Folia integrifima v. pinnatifida. Flores solitarii, pedunculosi, ebracteati, sæpiùs aurei.

Obs. *Scorzonera pinnatifida Michaux.*, species *Crepidis* est; ob involucrum calyculatum et pappum pilosum.

1. *S. bupleuroides*, caule erecto unifloro, foliis linear-lanceolatis acutis planis glabris basi villosis caule brevioribus, involucro pentaphyllo, pappo inæquali scabro.

Hab. in Nepaliæ alpibus. Wallich. 0.

Radix fusiformis. Caulis simplex, ferè pedalis, teres, glaber. Flosculi lutei, striati, involucro breviores.