

При обработке для «Флоры Грузии» рода *Scorzonera* L., нами установлен новый вид из Казбежского района по экземплярам, собранным в 1946 году А. Харадзе и Е. Хуцишвили, описание которого мы приводим ниже:

1. *Scorzonera Charadzae* V. Papava in Флора Грузии т. 8 (1952) 651, (descr. georg.).—*Scorzonera filifolia* Boiss. var. *vegetior* D. Sosn. in Зам. по сист. и геогр. раст. вып. 13 (1947) 64 non Trautv. Ic: Флора Грузии 1. с. tab. 435.

Стержень деревенеющий, утолщенный, покрыт бурими остатками расширенных шерстисто волосистых остатков старых листьев. Стеблей несколько 30—40 см высоты до середины облиственных, бороздчатых, тонкопушистых. Прикорневые и стеблевые листья удлинённые, линейные 10—30 см дл. и 0,2—0,5 см шир. с обеих сторон тонко войлочно опушенные. Цветочные стрелки заканчиваются обычно двумя корзинками (реже одной). Корзинки цилиндрические до 2 см дл. и до 1 см ширины. Листочки покрывала коричневые, рассеянно коротко опушенные, наружные мелкие, треугольно-ланцетные, острые, внутренние втрое длиннее наружных, продолговато-ланцетные, на верхушке заостренные, по спинке с бурым килем. Цветки желтые наружные без красноватых полосок, язычки на верхушке зазубренные. Семянки продолговатые, бороздчатые, изогнутые. Хохолок светло-желтый.

На известняковых скалах в среднем горном поясе.

Тип: ГССР, Казбежский район. Окрестности с. Чми: Правый борт ущ. Диднеуа-ком, 13.VII.1946, А. Харадзе и Е. Хуцишвили. Хранится в Тбилиси, в гербарии Института Ботаники АН ГССР.

Caudex lignescens incrassatus residuis fuscobrunneis lanatis foliorum emortuorum dense vestitus. Caules haud numerosi, 30—40 cm alti, ad medium foliosi, sulcati, tenuiter pubescentes. Folia radicalia caulinaque elongata, linearia 10—30 cm longa, 0,2—0,5 cm lata, utrinque tomentosopubescentia. Scapi plerumque calathidiis duobus, rarius uno terminati. Calathidia cylindrica ad 2 cm longa, ad 1 cm lata. Involucri phylla brunnea sparse breviter pubescentia, externa parva, triquetro-lanceolata, acuta, interna externis triplo longiora, oblongo-lanceolata, apice acuminata, dorso carinam brunneam instructa. Flores lutei; externi sine striis rubescentibus, apice crenati. Achenia oblonga, sulcata, subcurvata. Pappus pallide flavus.

Ad rupes calcareas, in regione montana media.

Typus. GSSR. Districtus Kasbegi, in viciniis p. Czmi in declivitate dextra faucis Didneua-com, 13.VII.1946, A. Charadze et E. Chutzischvili,

Affinitas. A *S. filifolia* var. *vegetior* flosculis externis striis rubescentibus destitutis, pappo pallide flavo, acheniis subcurvatis foliis latioribus differt.

Примечание. Данный вид был известен в литературе [5], как разновидность *Scorzonera filifolia* var. *vegetior* Trautv., последняя разновидность описана Е. Траутфеттером из Дагестана с Гуниба, по сборам Г. Радде [7].

На основании просмотра имеющихся в нашем распоряжении гербарных материалов, хранящихся в институте Ботаники, в Музее Грузии АН ГССР и в Ботаническом институте им. акад. Комарова в Ленинграде выяснилось, что габитуально вид *Scorzonera Charadzae* V. Par. весьма характерный и легко отличимый от близких видов *S. filifolia* Boiss. и *S. rubriseta* Lipsky. Наиболее близок к форме, известной как *S. filifolia* var. *vegetior* Trautv. отличаясь более высокими и олиственными цветочными стрелками, более широкими и длинными листьями и желтыми не окрашенными в красноватый цвет цветками и летучками, а также изогнутыми семянками.

Мы считаем, что вид *Scorzonera Charadzae* V. Par. выработался в результате приспособления к своеобразным условиям — на известняках средне горного пояса в Центральной части Главного Кавказского хребта (Казбежский район), а близкая форма *S. filifolia* var. *vegetior* Trautv. по видимому произрастает лишь в альпийском поясе Дагестана и Восточного Кавказа.

ЛИТЕРАТУРА — ლიტერატურა

1. შაბაძე ვ., გვარო *Scorzonera* საქართველოს ფლორა, VIII (1952), თბილისი.
2. Гроссгейм А. А., Флора Кавказа, IV (1934), Баку.
3. Гроссгейм А. А., Определитель растений Кавказа (1949), Москва.
4. Лишици С. Ю., Фрагменты к монографии рода *Scorzonera*... (1939). Москва.
5. Сосновский Д. И., О некоторых кавказских сложноцветных. Заметки по систематике и географии растений Инст. Бот. Ак. Н. Груз. ССР, 13 (1947).
6. Boissier E., Flora Orientalis III (1875), Genevae et Basileae.
7. Trautvetter E., Contributionem ad floram Dagestaniae ex herbario Raddeano anni 1885 eruit. Труды СПб. Бот. Сада, X (1887).