

\*20. SCORZONERA *capensis*. †

S. foliis lineari-lanceolatis glabris, caule paniculato.

*Thunb. prod.* 141.

Capische Haberwurz. W.

*Habitat ad Cap. b. Spei.*

\*21. SCORZONERA *chondrilloides*.

S. foliis linearibus obtusis subdentatis, caule ramosissimo, pedunculis squamosis. W.

Scorzonera chondrilloides. *Pourret.*

Chondrillaartige Haberwurz. W.

*Habitat in Hispania. (v. f.)*

Caulis quadripollicaris vel semipedalis ramosissimus divaricatus. fere aphyllus vel foliis brevioribus linearibus plerumque integerrimis sparsis obsitus. Folia radicalia linearia obtusa saepius runcinata, interdum repando-dentato, quandoque integerrima; radicalia fere semper runcinata vel dentata, inferiora caulina vero rarius runcinata. Pappus sessilis plumosus. Planta facie Chondrillae. W.

22. SCORZONERA *resedifolia*.

S. foliis linearibus dentato-pinnatifidis glabris, calycibus apice albido-cartilagineis, caule erecto. *Vahl. symb.* 2. p. 87.

S. foliis obtuse dentatis, caule divaricato, calycum apicibus tomentosis. *Sp. pl.* 1113. *Mill. dict. n.* 7.

Leontodon mucronatum. *Forsk. descr.* 144.

Chondrilla sicula tragopogonoides maritima. *Bocc. sic.* 13. t. 7. f. A. et C. A. bona.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 16.

Resedablättrige Haberwurz. W.

*Habitat in Hispania, Monspeli, Oriente.* 2 (v. f.)

Caulis divaricatus. Folia *Resedae* f. *Coronopi* dentibus obtusis.

*Distinctissima a sequenti: squamis calycinis apice albo-cartilagineis.* W.

\*23. SCORZONERA *calcitrapifolia*.

S. foliis inferioribus lyratis laciniis oblongis mucronatis, superioribus pinnatifidis. *Vahl. symb.* 2. p. 87.\*