

CLASSIS XIX.
SYNGENESIA.

SCORZONERA.

54 SCORZONERA TINGITANA.

DESCR. *Radix* annua, fusiformis. *Caulis* brevissimi, semipoll. diffusi, foliorum basi recti. *Folia* bipoll. amplexicaulia, confertissima, lanceolata, extrorsum dentato-sinuata; laciniae denticulatae, ciliatae. *Pedunculi* terminales, axillares, patentes. Axillares nudi, terminales, squama sub flore unica lineari-lanceolata, margine membranacea. *Calyx* basi gibbus. Squamae inferiores laxae, apice reflexae. *Corollae* flavae. *Semina* 4-angula, 4-fulcata, versus basin latiora, tuberculata: rarum visu in Sygenesia.

In desertis arenosis *Káhirinis*. Arab. *Nuggd.* نكد. Nulla pecora planta hac vescuntur, ne Cameli quidem, foli Afini non aspernantur.

55. SCORZONERA CILIATA; caule procumbente, ramoso, scabro; pedunculis squamosis; foliis retrorsum, alternatim obtuse sinuato-dentatis, glabris, margine aculeis ciliatis.

DESCR. *Radix* fibrosa, fusiformis. *Calyx* erectus: laciniae intimae multo longiores, lanceolatae; reliquae ovatae; omnes virides, margine albo, tenuissimo.

Alexandriae. Arab. *Schadæid.* Aliis *Hawwe.* حو

PICRIS.

56. PICRIS SCABRA.

DESCR. *Caulis* squamis 3 remotis, linearibus, erectis; *Flore* saepe unico, terminali. *Folia* repando-undulata, setis hispida, ut & scapus & calyx. *Semina* transversim striata. *Pappus* pedunculatus, plumosus.

In monte *Chádra.* Arab. *Murçeir.*

LACTUCA.

57. LACTUCA FLAVA; floribus ligulatis, flavis.

DESCR. *Caulis* dichotomo-ramosi; squama sub singulo ramo. *Folia* radicalia lyrato-sinuata; margine spinulis confertis mucronulata, caulina pauca, sinuata, amplexicaulia. *Calyx* calyculato-imbricatus, calyculo latere membranaceo. *Semina* scabra. *Pappus* stipitatus. *Receptaculum* nudum.

Surdúid. Arab. *Hindíbe.* هندب