

Hab. in rupestribus Libani inter Scanderouna et Jumalié propè Saida cl. Blanche. Floret Martio.

Caulis tandem pedalis, folia inferiora semipedalia 2-3 lineas lata secūs nervum medium validiorem plicata, capitula ea *Sc. humilis* æquantia. Hujus varietati angustifoliæ affinis differt involucri phyllis latioribus obtusis inferioribus magis abbreviatis, acheniis exterioribus scabridis nec lœvissimis. *Sc. parviflora* Jacq. quam habitu magis refert longius differt capitulis minoribus, flosculis involucrum non superantibus, etc. *Sc. Bætica* foliis crassiusculis, involucri phyllis acutissimis a nostrâ specie facilè distinguitur.

SCORZONERA CILICIA Boiss. (Sect. *Gelasia*.)

Sc. tota adpressè sericeo-cana radice crassâ cylindricâ verticali nigrâ rosulas foliorum caulesque laterales ascendentes edenti, caulis foliosis striatis adpressè canescentibus rigidis supernè ramos alternos monocephalos elongatos rigidos strictissimos edentibus, foliis radicalibus caulinisque inferioribus linearibus parallelè plurinerviis obtusiusculis, superioribus abbreviatis, rameis angustissimè lanceolatis acutissimis, capitulis parvis brevibus, involucri phyllis præter medianam partem virentem adpressè canescentem latè scariosis subcoriaceis lanceolatis acuminatis exterioribus triplo minoribus, flosculis flavis involucro tertia parte longioribus, acheniis tenuiter cylindricis striato-sulcatis glabris, pappi rufescens achenio sublongioris setis ad medium usquè scabris.

Hab. in rupestribus montium *Utsch Deppe* et *Gisyl Deppe* alt. 8000' cl. Kotschy.

Caules $\frac{1}{2}$ -1 pedales, folia 3-4 pollicaria $2\frac{1}{2}$ -3 lineas lata. Pendunculi cauli stricti 1-3 pollicares. Capitula magnitudinis eorum *Sc. pygmaea* a quâ caule elato ramoso involucrique phyllis acuminatis differt. *Sc. cinerea* Boiss. ei habitu affinis differt foliis multo latioribus, capitulis duplo majoribus, involucri phyllis duplo numerosioribus acutioribus.

SCORZONERA CINEREA Boiss. var. *undulatifolia* B. et Huet.

A typo speciei in montibus Persiae borealis crescenti differt foliis margine undulato-crispis apice magis attenuato-acuminatis.

Hab. circâ Erzeroum cl. Huet du Pavillon.

SCORZONERA GAGEOIDES Boiss. (Sect. *Lasiospora*.)

S. tota densè et crispè albo-villosa, rhizomate tenui nudo (repenti?), caulibus tenuibus erectis infernè nudis suprâ medium foliosis racemoso-subcorymbosis, foliis radicalibus paucis lanceo-lato-linearibus cauli subæquilongis plurinerviis infernè angustatis supernè longè attenuato-acuminatis, caulinis ad peduncularum ortum angustissimè linearibus capitula superiora superantibus, pedunculis lateralibus sub anthesi abbreviatis terminali elongato, capitulis minutis, involuci lanati phyllis lanceolatis acutis inferioribus paulò brevioribus, flosculis luteis involucrum paulò superantibus, acheniis junioribus hirsutis...

Hab. in ditione Beloutschistan cl. Stocks.

Caules tenues 6–8 pollicares in racemum 2–3 pollicarem 4–6 cephalum abeunt. Folia radicalia semipedalia medium versus 3–4 lineas lata ut et caules valdè lanata. Folia caulina angustissima summa setacea. Capitula e minimis generis ovata circiter sex lineas longa. Species quoad radicis indolem et achenia adhuc imperfectè nota habitu valdè singulari *Gageam villosam* quodam modo referens, propè *Sc. macrophyllum* Bunge in Lehm. (an F. et M.?) collocanda.

TARAXACUM DENUDATUM Boiss. et Noë.

T. rhizomate filiformi elongato ramoso (repenti?) nudo squamuoso nigro, collo inter squamas e basi persistenti petiolorum oriundas rufesceni-lanato, foliis.... antè florum evolutionem jam exsiccatis, pedunculis e collo 1–3 capitulo 2–4plò longioribus monocephalis pulverulento-hirtis squamulâ minimâ unâ alterâve minimâ obsitis, capitulis mediocribus, involuci polyphyllo phyllis glaucis triangulari-lanceolatis acutis apice minutè ciliatulis exterioribus brevioribus patenti-reflexis, acheniis pallidis angulatis striatis supernè squamuoso-muricatis rostro suo plus dimidiò brevioribus.

Hab. in Persiâ ad Kirrind propè Kermanchah cl. Noë. Floret Augusto.