

Flores ex flavo obsoletè purpurascunt.

745. *Tragopogon picroides.*

Habitat in agris *Cæsaraugusta*, en *Belchite*.

### SCORZONERA.

746. *Scorzonera hispanica.*

Oritur in montosis circà *Epila*, *Tronchon*, *Rodenas*.

Radix officinalis; etiam in acetaria recipitur.

747. *Scorzonera (Clusii) caule multifloro*, foliis radicalibus petiolatis, lanceolatis, nervosis.

*Scorzonera latifolia*, altera C. B. Pin. 275.

*Scorzonera major Pannonica* 1. Clus. Hist. 2. p. 138. fig. bona.

Vaillant. Act. Par. 1721. p. 207.

*Scorzonera plantagineo folio*, caule folioso Grislei *Virid. Lusit.* p. 75.

Habitat in agris *Cæsaraugusta*.

Planta pedalis. Radix carnosa. Caules ramosi, foliosi. Folia radicalia petiolata, lanceolata, quinquenervia, ut in *Plantagine lanceolata*; caulina ad ramorum extortum linearia. Flores lutei, ut in congeneribus.

748. *Scorzonera angustifolia.*

Provenit in agris *Cæsaraugusta*, en *Borja*.

749. *Scorzonera resedifolia.*

*Chondrilla Sicula* Boccon. Sic. p. 13. t. 7. f. 4.

Ad agrorum margines *Cæsaraugusta*.

A sequenti vix specie distinguitur, nisi calycis tomentum sufficiat, nam eadem facies, & foliorum in lacinias divisio.

750. *Scorzonera laciniata.*

Nonnullis locis vocatur *Farfallas*.

*Tragopogon laciniatus* foliis Colum. Phyt. p. 116. t. 32.

*Tragopogon Resedæ minoris* folio, erectum Barrel. Ic. 799.

*Scorzonera multifido folio* Grislei *Virid. Lusit.* p. 75.

Habitat in agris *Cæsaraugusta*, en *Epila*, *Hijar* &c.

Folia ad edendum idonea.

### PICRIS.

751. *Picris echooides.*

In agris vulgatissima *Cæsaraugusta*, en *Epila*, *Calatayud*, *Daroca* &c.

Folia radicalia ligulata, hispida, tuberculata.