

minata, 3—5 cm lata. Capitula media breviter pedunculata, oblongo-cylindrica, involucrium subglabrum vel subsericeum, squamae interiores anguste lanceolatae apice breviter subulato-acuminatae, squamae, exteriores late ovatae apice aculeato-acuminatae. Flosculi lutei. Achaenia glaberrima, immatura obtuse angulata, pappus basi plumosus apice scaber.

Transcaucasia (nunc Turcia): in distr. Artvin, in collibus prope pag. Barcevan, 18. VII. 1911 (G. Woronow).

По мнению Борнмюллера, видевшего экземпляры Ю. Н. Воронова, они должны быть отнесены к *S. tomentosa* L. var. *ovata* Freyn et Sint. (из Турецкой Армении). С таким определением вряд ли можно согласиться, так как указанная разновидность отличается от типа „foliis late ellipticis summis ovatis... duplo vel multo longioribus“, а наше растение имеет листья еще более мелкие, чем типичная *S. tomentosa* L. Кроме того, *S. Woronowii* не похожа на последний вид и по строению хохолка (перистого в нижней части) и скорее может быть сближена с *S. cinerea* Boiss., от которой также легко отличима формой листьев, очень густым бархатистым опушением, листочками обвертки, снабженными наверху шиловидным остроконечием.

Scorzonera colorata H. Krasch. sp. n. (sect. *Euscorzonera* DC. § *Foliosae* Boiss. Fl. or. III, p. 756). — Sub lente minute et crispule pubescens, radix tuberoso-incrassata, collum petiolorum reliquiis vestitum. Caules 30—40 cm alti, crassiusculi, sulcati, simplices vel simpliciter ramosi. Folia lanceolato-linearia margine plus minusve undulato-crispata, apice acutiuscula et interdum circinnata, radicalia 15—20 cm longa, caulina interiora 10—15 cm longa, 5—15 mm lata. Capitula longe pedunculata, oblonga, 1—2 cm in diam., 4—5 cm longa. Flosculi..., squamae interiores oblongo-lanceolatae, 3—4 cm longae, nervis parallelis plus minusve valde prominentibus, apice obtusae, squamae exteriores lanceolatae, 1—2 cm longae, apice acutiusculae vel obtusae. Achaenia elongata, cylindrica, biformia, 8 cm longa, interna glaberrima, obscure sulcata, externa matura plus minusve dense transverse lamellato-muricata, nigra vel brunnea 18—20 mm longa, stipes cavus 2—3 mm longus. Pappus plumosus fuliginosus 15—20 mm longus, setis intricatis.

Transcaucasia (nunc Turcia): in distr. Kaghyzman, in angustiis Zarabchan-czai, in rupestribus, 3. VII. 1913, n° 12688 (G. Woronow); in angustiis prope Kjul-ogly, in detritu lapidoso, 5. VII. 1913, n° 12687 (idem).

От близкой *S. mollis* M. B.¹ хорошо отличается более крупными корзинками, широкими немногочисленными листьями, черными семянками, темно окрашенным хохолком и т. д.

¹ По нашему мнению, Boissier во „Flora orientalis“, судя по диагнозу и гербарным материалам, под именем *S. mollis* M. B. объединил несколько различных форм. Настоящая *S. mollis* M. B. s. str. распространена в степных районах Европейской части Союза и должна быть отнесена к группе *Foliosae*. Малоазиатские формы образуют особый вполне самостоятельный цикл и действительно относятся к группе *Scaposae* (например *S. Szowitzii* DC.).