

Q

QUERCUS  
Aesculus \*  
coccifera \*  
Fontanesii Guss. \*

Haec est *Q. pseudo-suber* Desf., quae a *Q. pseudo-subere Santi* omnino differt foliis deciduis non perennantibus.

Suber \*

R

RANUNCULUS  
angulatus Presl. \*  
brevifolius Ten.  
bullatus \*  
bulbosus \*  
flabellatus Desf. \*  
lateriflorus Dc.  
millefoliatus Vahl. \*  
ophioglossifolius Vill. \*  
polyanthemus  
laciniatus  
spicatus Desf. \*  
trifolius H. R. M.  
trilobatus Desf. \*

RAWOLFIA  
tomentosa

RESEDA  
fruticosa \*  
odorata  
virescens Hornem.

RHAMNUS  
catharticus \*

RHINANTHUS  
Cristagalli  
villosus Pers.

RHUS  
elegans Ait.  
laevigatum  
lucidum  
oxycanthoides D. Cours.  
Thezera Desf. \*

RHIZANTHUS  
nigrum  
rubrum

RHIZOPHYLLIS  
leucocarpus Bert.

RHYNCHOPHYLLIS  
brasiliensis NoCCA  
humilis  
laevis

ROBINIA  
Althagana Herit.  
viscosa Vent.

ROSA  
blanda Ait.  
canina Dew. \*  
eglanteria  
glutinosa Sibth. \*  
rubiginosa Red. \*  
sepium Desv.  
sulphurea Ait.

RUBIA  
angustifolia \*  
Bocconi Pet. \*

RUBRERIA  
aspera Desf.  
digitata Mill.  
laciniata  
pinnata Vent.  
purpurea  
triloba.

RUELLIA  
infundibuliformis Andr.  
ocymoides Cav.  
ovata Cav.  
tuberosa

RUMEX  
alpinus  
arifolius  
dentatus  
divaricatus \*  
maritimus  
multifidus \*  
sanguineus  
spinus \*  
verticillatus

RUTA  
bracteata Dc. \*

S

SACCHARUM  
giganteum Pers.  
Ravennae \*  
Teneriffae \*

SALSOLA  
oppositifolia Desf. \*

SALVIA  
amarissima Ort.  
amplexicaulis Lam.  
aurea  
bicolor Lam.  
bullata Ort.  
canariensis \*  
ceratophylloides \*  
clandestina \*  
coccinea  
disermas  
haematodes  
hirsuta Jacq.  
hispanica

SALVIA  
interrupta Schousb.  
lanceolata Brous.  
lyrata  
mexicana  
napifolia Ait.  
niotica Murr.  
phlomidoides Asso.  
pinnata  
pimpinifera  
polystachya Ort.  
pratensis  
pseudo-coccinea Jacq.  
Sclareaea \*  
pyramidalis Pet.  
tingitana Ettlg.  
triloba  
viridis \*

SANSEVERINIA  
guineensis Willd.  
zeylanica Willd.

SANTOLINA  
maritima Smith. \*  
viridis

SANVITALIA  
procumbens Willd.

SAPOINARIA  
bellidifolia Smith.  
calabrica Guss.

Facies *S. ocymoidis*; sed abunde diversa, radice annua, et petalorum laminis rotundis basi constrictis. In Calabria.

depressa Biv. \*  
illyrica \*

SATUREIA  
capitata \*  
graeca \*  
nervosa \*  
tenuifolia Ten. \*  
Thymbra

SAXIFRAGA  
calyciflora Lapeyr.  
lingulata Bell. \*  
parviflora Biv. \*

SCABIOSA  
africana  
brachiata Smith.  
caucasica Bbrst.  
corniculata  
crenata Cyr. \*  
cretica \*  
dichotoma Ucria \*  
graminifolia  
gramuntia  
leucantha  
limonifolia Vahl. \*

SCABIOSA  
lucida Vill.  
papposa  
pilosa Lag. \*  
prolifera  
sicula  
stellata

SCANDIX  
brachycarpa Guss. \*

*S. australi et falcatae* Bbrst. affinis; sed seminum rostro bifariam non undique hirsuto ab *australi*; et caule glaberrimo, ramis divaricatis, fructibus a medio ad basin valde incrassatis ab utriusque diversa.

SCILLA  
autumnalis \*  
bifolia \*  
Cupani Guss. \*

Est *Ornithogalum coeruleum* Raf., sed genere huc spectat.

intermedia Guss. \*

Flores *S. autumnalis*; folia fere *S. parviflorae*; capsula obcordata.

SCIRPUS  
Savii Seb. Maur. \*

SCLERANTHUS  
perennis \*

SCORZONERA  
calcitrapifolia Vahl. \*  
Columnae Guss. \*

Diff. a *S. hirsuta*; cui caeterum similis, seminibus glabris, spinulis sursum versis, asperis.

deliciosa Guss. \*

*S. undulatae, purpureae et tuberosae* affinis; at radice tuberosa oblongo-cylindracea, caule simplici vel basi tantum ramoso, foliis basi farinoso-tomentosis, squamis calycinis imbricatis glaberrimis acutis, ab illis diversa. Corolla purpurea.

hirsuta \*  
laciniata \*  
octangularis Roth. \*

SCROPHULARIA  
bicolor Sibth. \*  
grandidentata Ten. \*  
mellifera Vahl.  
sambucifolia