

composée de demi-fleurons tous hermaphrodites. Les semences sont oblongues, linéaires, surmontées d'une aigrette plumeuse, un peu pédicellée.

Cette plante croît dans la Galatie. (*Descript. ex Willd.*)

27. SCORZONÈRE à fleurs de crépis. *Scorzonera crepioides*.

*Scorzonera caule ramosissimo, floribus subpaniculatis; calicibus albido-pubescentibus, pappo simplici.* (N.)

Je ne connois ni la partie inférieure ni les feuilles de cette plante : le caractère de ses fleurs la range parmi les scorzonères, quoiqu'elle ait l'aspect d'un crépis, étant même assez ressemblante au crépis biennis.

Ses tiges se divisent en rameaux assez nombreux, grêles, cylindriques, striés, un peu pubescens, ramifiés à leur sommet, nus dans leur longueur, munis, à leur base & à celle de leurs divisions, d'une petite feuille sessile, amplexicaule, linéaire, lancéolée, acuminée, velue.

Les fleurs sont d'une grandeur médiocre, disposées, à l'extrémité des rameaux, en une sorte de panicule, dont les pédoncules sont grêles, blanchâtres, pubescens, inégaux ou supportant quelquefois deux ou trois fleurs pédicellées. Les calices sont ovales, ferrés, composés d'écaillés droites, inégales, imbriquées; les intérieures plus longues, étroites, linéaires, obtuses, pubescentes, un peu blanchâtres, presque farineuses; les extérieures très-courtes, ovales. La corolle est jaune, une fois plus longue que le calice, composée de demi-fleurons tous hermaphrodites, denticulés à leur sommet. Les semences sont courtes, ovales, oblongues, striées longitudinalement, surmontées d'une aigrette sessile, très-blanche; les poils fins, simples & soyeux. Le réceptacle est nu.

J'ai recueilli cette plante sur les côtes de Barbarie, dans les environs de la Calle. (*V. v.*)

28. SCORZONÈRE naine. *Scorzonera pumila*.

*Scorzonera foliis pinnatifidis, acutis, glabris; scapo squamoso, glabro, unifloro.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1507. n°. 26.

*Scorzonera (acaulis), foliis pinnatis; pinnulis linearibus, glabris; apicibus albis.* Cavan. Ic. Rar. vol. 2. pag. 19. tab. 121. fig. 2.

Ses racines sont courtes, grêles, cylindriques, garnies de quelques fibres rares : il s'en élève des tiges courtes, foibles, cylindriques, très-simples, uniflores, longues de deux ou trois pouces, dépourvues de feuilles, garnies seulement de quelques écaillés éparées, courtes, aiguës. Les feuilles,

Botanique. Tome VII.

toutes radicales, sont étroites, alongées, nombreuses, étendues sur la terre, charnues, d'un vert-foncé, presque pinnatifides; les découpures courtes, linéaires, inégales, aiguës, terminées par une petite glande très-blanche, surmontées d'un petit filet soyeux.

Les fleurs sont grandes, de couleur jaune, solitaires à l'extrémité des tiges. Le calice est alongé, presque cylindrique, composé d'écaillés imbriquées, lancéolées, d'un vert-roussâtre, aiguës. La corolle est formée de demi-fleurons, tous terminés par cinq petites dents; les extérieurs plus longs que les intérieurs. Le réceptacle est nu; les semences étroites, alongées, surmontées d'une aigrette sessile & pileuse.

Cette plante croît en Espagne, aux pieds des montagnes, en face de la mer. ☉ (*Descript. ex Cavan.*)

29. SCORZONÈRE à feuilles de pissenlit. *Scorzonera taraxacifolia*. Jacq.

*Scorzonera foliis runcinatis, obtusis, glabris; scapo aphylo, ramoso; pedunculis incrassatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1508. n°. 30.

*Scorzonera (taraxacifolia), foliis runcinatis, in petiolum decurrentibus; scapo ramoso, aphylo.* Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 160. — Idem, Collect. 152.

Ses racines sont droites, épaisses, fusiformes, jaunâtres en dehors, garnies de quelques fibres charnues, & de filamens courts, capillaires : il s'en élève plusieurs tiges droites, médiocrement rameuses, dépourvues de feuilles. Les rameaux sont alternes, nus, très-simples. Les feuilles, toutes radicales, ressemblent assez à celles du pissenlit; elles sont lancéolées, alongées, obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, roncées à leurs bords ou échancrées en découpures irrégulières, obtuses, rétrécies & decurrentes sur le pétiole à leur base.

Les fleurs sont solitaires, terminales, supportées par de longs pédoncules simples, striés, un peu renflés à leur sommet. Les calices sont légèrement hispides, composés d'écaillés droites, imbriquées, inégales; les intérieures très-longues, subulées. La corolle est jaune, assez grande; les demi-fleurons obtus, tronqués & presque entiers à leur sommet; les semences étroites, subulées, surmontées d'une aigrette courte, simple, sessile.

Cette plante croît dans la Bohême. ☿

30. SCORZONÈRE alongée. *Scorzonera elongata*. Willd.

*Scorzonera foliis subtus tomentosis, radicalibus lyratis, caulinis pinnatis; cauliculis subramosis, foliosis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1508. n°. 32.