

Rauhe Haberwurz. W.

*Habitat in Apulia, Oriente. 2 (v. f.)*

Folia *canaliculata*. Semina *hirsuta, alba, papposa*.  
H. V.

\* 17. SCORZONERA *villosa*.

S. foliis linearibus carinatis villosis, caule ramoso. W.

S. (*villosa*) tota villosa, caule ramoso striato, foliis carinatis integerrimis, semiflosculis flavis, extimis subtus rubellis. *Scop. carn. n. 952. t. 46.*

Zottige Haberwurz. W.

*Habitat Tergesti.*

*Tota planta villosa et ramosa. W.*

\* 18. SCORZONERA *eriosperma*.

S. foliis linearibus acuminatis carinatis basi lanatis, caule ramoso, calycibus incanis, seminibus tomentosis. W.

S. (*eriosperma*) foliis lineari-subulatis canaliculatis cauleque basi sublanatis, seminibus tomento, candidissimo tectis. *Marsch. casp. 117. n. 28. (excluso synonymo.)*

Wollensamige Haberwurz. W.

*Habitat in graminosis arenosis montium ad mare Caspium. 2 (v. v.)*

\* 19. SCORZONERA *cretica*. W.

S. foliis linearibus planis subciliatis, caule basi ramoso, seminibus tomentosis. W.

S. *cretica* angustifolia, semine tomento candidissimo. *Tournef. cor. 36.*

Cretische Haberwurz. W.

*Habitat in Cræta. 2 (v. f.)*

*Radix crassitie digiti multiceps. Folia linearia ciliata praecipue basin versus, plana nervosa longitudine plantae. Caules ascendentes digitales basi in ramos binos vel tres divisi, et ad divisionem folio brevi instructi, superne nudi squamis aliquot sparsis obsiti. Calyx imbricatus squamis exterioribus brevissimis margine membranaceis pubescentibus, interioribus elongatis membranaceis. W.*